Инструкция по применению
Пиковит Таблетки покрытые оболочкой 4+ 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словения
Производитель: КРКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 30

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой интенсивно розового, желтого, зеленого и оранжевого цвета. Допускаются вкрапления.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:Действующие вещества:Ретинола пальмитат концентрат1) (витамин А), синтетический, масляная форма (1,7 ММЕ/г) 0,35 мгКолекальциферол концентрат2), масляная форма (витамин D3) (1 ММЕ/г) 0,08 мгАскорбиновая кислота (витамин С) 10,00 мгТиамина мононитрат (витамин В1) 0,25 мгРибофлавин (витамин В2) 0,30 мгПиридоксина гидрохлорид (витамин Вб) 0,30 мгЦианокобаламин 0,1 % в маннитоле (Е421) (витамин В12) 0,20 мгНикотинамид 3,00 мгФолиевая кислота 0,04 мгКальция пантотенат 1,20 мгКальция гидрофосфаг 43,00 мгВспомогательные вещества: лактозы моногидрат, ароматизатор апельсиновое масло 05073, полисорбат 80, глицерол, касторовое масло, лимонная кислота, сорбитол (Е420), декстроза (глюкоза жидкая) (сухое вещество), магния стеарат, Кайол 600 Фарма, вазелиновое масло, повидон К-25, диметикон (пеногаситель 1510) (Е900), сахароза1 таблетка, покрытая оболочкой интенсивно розового цвета, дополнительно содержит: краситель пунцовый [Понсо 4R] (Е124), титана диоксид (Е171)1 таблетка, покрытая оболочкой желтого цвета, дополнительно содержит: краситель солнечный закат желтый 06080 (Е110), краситель хинолиновый желтый (Е104), титана диоксид (Е171)1 таблетка, покрытая оболочкой оранжевого цвета, дополнительно содержит: краситель солнечный закат желтый 06080 (Е110), титана диоксид (Е171)1 таблетка, покрытая оболочкой зеленого цвета, дополнительно содержит: краситель индигокармин (Е132), краситель хинолиновый желтый (Е104), титана диоксид(Е171)1) ретинола пальмитат концентрат содержит: ретинола пальмитат, бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол.2) колекальциферол концентрат содержит: колекальциферол, DL-#-токоферол и триглицериды среднецепочечные жирных кислот.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика дефицита витаминов и минералов при: неполноценном и несбалансированном питании, вследствие отсутствия аппетита, при переутомлении у детей школьного возраста.В комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся назначением антибиотиков.

Способ применения и дозы

Внутрь, таблетки Пиковит® следует держать во рту до полного растворения.Детям в возрасте от 4 до 6 лет рекомендуется принимать по 1 таблетке 4-5 раз в сутки.Детям в возрасте от 7 до 14 лет рекомендуется принимать по 1 таблетке 5-7 раз в сутки.Курс приема препарата - 20-30 дней. Повторный курс приема по рекомендации врача.При отсутствии аппетита у детей препарат Пиковит® можно давать детям в течение 2-х месяцев.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Гипервитаминоз А и Д. Детский возраст до 4-х лет.Врожденная непереносимость глюкозы, фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, дефицит сахаразы/изомальтазы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременные и кормящие женщины могут принимать витамины и минералы по рекомендации врача. Дозы витаминов в препарате Пиковит®, таблетки, покрытые оболочкой, предназначены для детей.

Побочные действия

Аллергические реакции, в том числе анафилактические реакции.Высокие дозы глицерола могут вызывать головную боль, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея).Препарат Пиковит® содержит азокрасители (Е124) и (Е110), которые могут вызывать реакцию повышенной чувствительности с астматическим компонентом. Подобные реакции чаще отмечаются у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.

Передозировка

Случаев передозировки отмечено не было.СимптомыСимптомами гипервитаминоза А после кратковременного применения больших доз витамина А являются боль в животе, анорексия, рвота, нарушение зрения, головная боль, некоординируемые движения и покраснение кожи. Длительное применение больших доз витамина А может вызывать истончение и зуд кожи, трещины на губах, воспаление конъюнктивы, повреждение глаз, боль в суставах, хроническую головную боль и многократную рвоту. Симптомами гипервитаминоза Д, которые могут возникать после применения больших доз витамина Д, являются анорексия, потеря веса, усталость, дезориентация, рвота, запор или диарея, металлический привкус во рту, сухость слизистой оболочки полости рта и жажда.Для того чтобы избежать передозировки, не рекомендуется превышать суточную дозу.ЛечениеВ случае развития симптомов передозировки применение препарата Пиковит® должно быть прекращено.Лечение симптоматическое. Следует вызвать рвоту и ввести достаточное количество жидкости. Ограничить поступление с пищей кальция и витамина Д для предупреждения гиперкальциемии.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат Пиковит® содержит кальций и поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тстрациклинов, а также антимикробных средств - производных фторхинолонов (необходимо, чтобы между приемами препаратов был интервал не менее 2-х часов). Витамин С усиливает действие и побочные эффекты антимикробных средств из группы сульфаниламидов (в том числе появление кристаллов в моче).При одновременном применении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет - совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.Не рекомендуется принимать препарат Пиковит® совместно с другими препаратами, содержащими витамины и минералы.Высокие дозы глицерола могут вызывать головную боль, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея).Препарат Пиковит® содержит азокрасители (Е124) и (Е110), которые могут вызывать реакцию повышенной чувствительности с астматическим компонентом. Подобные реакции чаще отмечаются у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.В препарате содержится 192 мг лактозы, 611 мг сахарозы, 160 мг глюкозы и 134,2 мг сорбитола, поэтому препарат не рекомендован детям с врожденной непереносимостью глюкозы и фруктозы, с синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции и дефицитом сахаразы /изомальтазы.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:О влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами не сообщалось.Препарат не оказывает влияния на двигательную функцию детей.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.Хранить в недоступном для детей месте.