Инструкция по применению
Пиковит Таблетки покрытые оболочкой 4+ 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словения
Производитель: КРКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 60

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

Ретинола пальмитат (витамин А пальмитат концентрат, синтетический, масляная форма (1,7 млн. МЕ/г), (что соответствует 600 МЕ витамина А) 0,35 мг Колекальциферол концентрат, масляная форма (1 млн. МЕ/г), (что соответствует 80 МЕ витамина D3) 0,08 мг,Аскорбиновая кислота (витамин С) 10 мг, Тиамина мононитрат (витамин В1) 0,25 мг, Рибофлавин (витамин В2) 0,3 мг, Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 0,3 мг, Цианокобаламин 0,1 % в маннитоле (что соответствует 0,20 мкг витамина В12) 0,2 мг, Никотинамид (витамин РР) 3 мг Кислота фолиевая 0,04 мг, Кальция пантотенат (витамин В5) 1,2 мг, Кальция гидрофосфат, (кальция фосфат двузамещенный,безводный (что соответствует иону кальция -12,5 мг и иону фосфора-10 мг) 43 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, ароматизатор Апельсиновое масло 05073, полисорбат 80 (твин 80), глицерол, масло касторовое, неочищенное, лимонная кислота, безводная, сорбитол, декстроза (глюкоза жидкая) (сухое вещество), магния стеарат, воск эмульсионный, вазелиновое масло, повидон, пеногаситель 1510, сахароза. 1 таблетка розового цвета дополнительно содержит: краситель пунцовый [Понсо 4R] (Е124), титана диоксид (Е171). 1 таблетка желтого цвета дополнительно содержит: краситель солнечный закат желтый 06080 (Е110), краситель хинолиновый желтый (Е104), титана диоксид (Е171). 1 таблетка оранжевого цвета дополнительно содержит: краситель солнечный закат желтый 06080 (Е110), титана диоксид (Е171). 1 таблетка зеленого цвета дополнительно содержит: краситель индигокармин (Е132), краситель хинолиновый желтый (Е104), титана диоксид (Е171).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Действие препарата Пиковит® является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным. Все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

Показания

Профилактика дефицита витаминов и минералов: — при неполноценном и несбалансированном питании; — вследствие отсутствия аппетита; — при переутомлении у детей школьного возраста. В комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся назначением антибиотиков.

Способ применения и дозы

Препарат следует принимать внутрь. Таблетки держать во рту до полного растворения. Детям в возрасте от 4 до 6 лет рекомендуется принимать по 1 таблетки 4-5 раз в сутки Детям в возрасте от 7 до 14 лет рекомендуется принимать по 1 таблетки 5-7 раз в сутки Продолжительность курса приема препарата составляет 20-30 дней. Повторный курс приема препарата возможен по рекомендации врача. При отсутствии аппетита у детей Пиковит® можно давать детям в течение 2-х месяцев.

Противопоказания

— гипервитаминоз A; — гипервитаминоз D; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка

Случаев передозировки препарата отмечено не было. Риск передозировки препаратом Пиковит® минимальный.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат содержит кальций и поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов, а также антимикробных средств – производных фторхинолонов (необходимо, чтобы между приемами препаратов был интервал не менее 2-х часов). Витамин С усиливает действие и побочные эффекты антимикробных средств из группы сульфаниламидов (в том числе появление кристаллов в моче). При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет – совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина. Не рекомендуется принимать Пиковит совместно с другими препаратами, содержащими витамины и минералы. Высокие дозы глицерола могут вызвать головную боль, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея). Пиковит содержит азокрасители Е 124 и Е 110, которые могут вызвать реакцию повышенной чувствительности с астматическим компонентом. Подобные реакции чаще отмечаются у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте. В препарате содержится 192 мг лактозы, 611 мг сахарозы, 160 мг глюкозы и 134 мг сорбитола поэтому препарат не рекомендован детям с врожденной непереносимостью глюкозы и фруктозы, с синдромами мальабсорбции глюкозы/галактозы и дефицита сахарозы/изомальтозы.

Условия хранения

от 2# до 25#