Инструкция по применению
Пиковит Сироп для детей с 1 года 150 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Словения
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 1



Описание

Густая, вязкая жидкость, от светло-желтого до коричневато-оранжевого цвета с запахом цитрусовых и кислым вкусом. Допустимо присутствие едва видимых включений.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

5 мл сиропа содержит:активные вещества: ретинола пальмитат 1,7 Mio ME/г (витамин A) 900 ME, колекальциферол 1 Mio ME/г (витамин D3) 100 ME, рибофлавина фосфат натрия (витамин B2) 1 мг, пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) 0,6 мг, тиамина гидрохлорид (витамин B1) 1 мг, цианокобаламин (витамин B12) 1 мкг, аскорбиновая кислота (витамин C) 50 мг, никотинамид (витамин PP) 5 мг, декспантенол (D-пантенол) 1 мг,вспомогательные вещества: агар, камедь трагакантовая, сахароза, декстроза (глюкоза) жидкая, апельсиновое масло, ароматизатор грейпфрутовый, ароматизатор апельсиновый, полисорбат 80 (твин 80), лимонная кислота, моногидрат, краситель пунцовый [Понсо 4R] (E124), натрия бензоат, вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Пиковит® сироп для детей применяют в качестве профилактического средства при состояниях, сопровождающихся повышением потребности в витаминах: переутомление у детей школьного возраста, повышенная физическая и нервно-психическая нагрузка, при отсутствии аппетита и нерегулярном, неполноценном или однообразном рационе питания, в период выздоровления после перенесенных заболеваний, для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям.В комплексной терапии при применении химиотерапевтических средств.

Способ применения и дозы

Препарат принимается внутрь.Дети в возрасте от 1 до 3 лет: по 1 чайной ложке 2 раза в день (10 мл сиропа в сутки).Дети в возрасте от 4 до 6 лет: по 1 чайной ложке 3 раза в день (15 мл сиропа в сутки)Дети в возрасте от 7 до 14 лет: по 1 чайной ложке 3-4 раза в день (15-20 мл сиропа в сутки).Сироп можно давать с ложечки или смешивать с чаем, соком или фруктовым пюре.При отсутствии аппетита сироп следует давать ежедневно в течение 1 месяца.Повторный курс приема через 1-3 месяца или по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Сахарный диабет (Пиковит® сироп для детей содержит 3 г сахара в 5 мл сиропа).Гипервитаминоз А и Д.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.Не превышайте рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз немедленно обратитесь к врачу.

Передозировка

Случаев передозировки препаратом отмечено не было.

Взаимодействие с другими препаратами

Витамин С усиливает действие и побочные эффекты антимикробных средств из группы сульфаниламидов (в том числе появление кристаллов в моче).

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет - совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.Не рекомендуется принимать Пиковит® совместно с другими препаратами, содержащими витамины.5 мл сиропа Пиковит® содержит 3,3 г сахарозы, 0,7 г глюкозы, поэтому препарат не рекомендован детям с врожденной непереносимостью глюкозы и фруктозы, с синдромами мальабсорбции гдюкозы/галактозы и дефицита сахарозы/изомальтозы.Препарат содержит азокраситель Е 124 , который может вызвать реакцию повышенной чувствительности, с астматическим компонентом. Подобные реакции чаще отмечаются у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.Бензойная кислота обладает слабораздражающим действием на кожу и слизистые оболочки.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в защищенном от света месте.Хранить в недоступном для детей месте.