Инструкция по применению
Пимафуцин Крем 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Италия
Производитель: ЛЕО ФАРМА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Натамицин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 48



Действующее вещество

Натамицин

Состав

1 таб. висмута трикалия дицитрат 304.6 мг, что соответствует содержанию висмута оксида 120 мг. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 70.6 мг, повидон К30 - 17.7 мг, полиакрилат калия - 23.6 мг, макрогол 6000 - 6 мг, магния стеарат - 2 мг. Состав оболочки: опадрай OY-S-7366 (гипромеллоза 5 мПа·с - 3.2 мг, макрогол 6000 - 1.1 мг).

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При нанесении на кожу и слизистые оболочки практически не подвергается системной абсорбции, поэтому не оказывает системного действия.

Показания

грибковые заболевания кожи и слизистых оболочек, вызванные чувствительными к препарату возбудителями (в т.ч. вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, баланопоститы, вызванные грибами рода Candida; кандидоз кожи и ногтей; наружный отит, либо первично вызванный грибами, либо осложнившийся кандидозом; дерматомикозы).

Способ применения и дозы

При дерматомикозах (в т.ч. кандидозах кожи, опрелостях у детей) крем наносят на пораженную поверхность кожи один или несколько (до 4-х) раз в сутки. При микозе наружного слухового прохода пораженную поверхность смазывают кремом один или несколько раз (до 4 раз) в сутки. Перед применением препарата ухо очищают. После применения препарата в слуховой проход помещают тампон из натурального материала (хлопка, шерсти). При вульвите, вульвовагините, баланопостите крем наносят на пораженные участки кожи один или несколько раз в сутки. Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение Пимафуцина при беременности и в период лактации. Данные о неблагоприятном воздействии на плод отсутствуют.

Побочные действия

Местные реакции: возможны легкое раздражение, ощущение жжения.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пимафуцин не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Пимафуцин не описано.

Особые указания

В случае хронической или рецидивирующей инфекции местное лечение может быть дополнено назначением Пимафуцина в форме таблеток. Использование в педиатрии Крем для наружного применения Пимафуцин можно назначать новорожденным.

Условия хранения

Беречь от детей