Инструкция по применению
Пимафуцин Суппозитории вагинальные 100 мг 3 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Италия
Производитель: ЛЕО ФАРМА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Натамицин
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 24

Действующее вещество

Натамицин

Состав

Натамицин (natamycin) 100 мг. Вспомогательные вещества: цетиловый спирт - 690 мг, жир твердый - 700 мг, сорбитана триолеат - 460 мг, полисорбат 80 - 460 мг, натрия гидрокарбонат - 69 мг, адипиновая кислота - 64 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

При нанесении на кожу и слизистые оболочки практически не подвергается системной абсорбции, поэтому не оказывает системного действия.

Показания

Вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, вызванные, главным образом, грибами рода Candida

Способ применения и дозы

Назначают по 1 вагинальному суппозиторию в течение 3-6 дней. Суппозиторий вводят во влагалище в положении лежа, как можно глубже, 1 раз/сут на ночь.При упорном течении вагинитов, вызванных Candida albicans, дополнительно назначают Пимафуцин; в форме таблеток для приема внутрь (по 1 таб. 4 раза/сут в течение 10-20 дней) для санации очага кандидозной инфекции в кишечнике. Для лечения кандидозного поражения половых органов партнера используют Пимафуцин; в форме крема.Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение Пимафуцина при беременности и в период лактации.Данные о неблагоприятном воздействии на плод отсутствуют.

Побочные действия

Местные реакции: возможны легкое раздражение, ощущение жжения.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пимафуцин; не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Пимафуцин; не описано.

Особые указания

Суппозитории вагинальные под действием температуры тела быстро растворяются, образуя пенистую массу, что способствует равномерному распределению активной субстанции.В период менструации терапию суппозиториями прерывают.В период применения суппозиториев нет необходимости в исключении половых контактов. Однако рекомендуется провести обследование половых партнеров и в случае выявления кандидозного поражения провести курс лечения Пимафуцином. Также в период лечения следует пользоваться барьерными средствами контрацепции.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПимафуцин; не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей