Инструкция по применению
Пиносол мазь назальная 10 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Словакия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Азулен+Витамин Е+Мяты перечной листьев масло+Пихты масло+Тимол+Эвкалипта прутовидного листьев масло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Действующее вещество

Азулен+Витамин Е+Мяты перечной листьев масло+Пихты масло+Тимол+Эвкалипта прутовидного листьев масло

Состав

В 10 г содержится активное вещество – эфирно-масляная композиция. Вспомогательные вещества: вазелин белый - 5.499 г, воск белый - 2 г, макрогола и глицеридов абрикосового масла эфиры (лабрафил М-1944-CS) - 1 г, бутилгидроксианизол - 1 мг.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Пиносол не предоставлены

Показания

Острый ринит;— хронический атрофический ринит;— острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки;— при состояниях после оперативного вмешательства в полости носа (в условиях стационара и амбулаторно)

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 2 лет препарат наносят в количестве приблизительно 0.5 см в каждый носовой ход на поверхность слизистой оболочки передних отделов носовой полости. Для введения можно использовать ватный тампон (палочку, обернутую в конце комочком ваты). Затем умеренным надавливанием на крылья носа растирают мазь по слизистой оболочке носа.Процедуру повторяют 3-4 раза/сут. Длительность лечения составляет 7-14 дней. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача

Противопоказания

Аллергический ринит;— детский возраст до 2 лет;— повышенная чувствительность к компонентам препарата

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение Пиносола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям

Побочные действия

Местные реакции: зуд, чувство жжения, гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа

Передозировка

При местном применении вероятность развития передозировки препарата Пиносол маловероятна

Особые указания

Пациента следует информировать о том, что при развитии побочных реакций следует обратиться к врачу

Условия хранения

В сухом месте