Инструкция по применению
Пиперазин Таблетки 500 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пиперазина адипинат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 48.0

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого цвета, с фаской и риской

Действующее вещество

Пиперазина адипинат

Состав

Действующее вещество: пиперазина адипинат – 500,0 мг вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 77,0 мг, тальк – 18,0 мг, желатин – 5,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

препарат быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Выводится из организма в основном почками.

Показания

Аскаридоз и энтеробиоз

Способ применения и дозы

Внутрь. При лечении аскаридоза препарат назначают в течение двух дней подряд по 2 раза в день за 1 ч до или 0,5–1 ч после еды в следующих дозах: взрослым и детям от 15 лет — по 1,5–2,0 г детям в возрасте от 3 до 5 лет – 0,5 г (суточная доза 1,0 г), от 5 до 8 лет – 0,75 г (суточная доза 1,5 г), от 8 до 12 лет – 1,0 г (суточная доза 2,0 г), от 13 до 15 лет – 1,5 г (суточная доза 3,0 г). Возможно применение препарата в течение одного дня однократно в дозе от 0,5 г до 4,0 г в зависимости от возраста. Максимальная суточная доза у взрослых 4,0 г. При энтеробиозе в тех же дозах препарат назначают в течение 5 дней подряд (проводят 1 -3 курса терапии с 7-дневным перерывом между курсами) или в течение одного дня однократно в дозе от 0,5 г до 4,0 г в зависимости от возраста. В перерывах между циклами назначается клизма на ночь для механического вымывания остриц (взрослым 4 – 5 стаканов воды, детям 1 -2 стакана с добавлением ½ чайной ложки натрия бикарбоната на стакан воды).

Противопоказания

Органические заболевания центральной нервной системы. Гиперчувствительность. Хроническая почечная недостаточность, беременность и период грудного вскармливания. Детский возраст до 3 лет (для данной дозировки).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Пиперазин противопоказано при беременности. При необходимости назначения препарата в период грудного вскармливания, кормление грудью следует прекратить.

Побочные действия

Редко наблюдается тошнота, абдоминальные боли, головная боль, которые быстро исчезают. У больных с почечной недостаточностью могут наблюдаться нейротоксические осложнения (мышечная слабость, тремор, эйфория, галлюцинации, ухудшение зрения, нарушение координации движений).

Передозировка

при передозировке наблюдаются невыраженные мышечная слабость, тремор, нейротоксические явления, особенно у больных с нарушениями выделительной функции почек. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов – активированного угля), симптоматическое лечение. При необходимости проводят оксигено- и трансфузионную терапию. При неврологических симптомах вводят тиамин.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает выраженность экстрапирамидных нарушений, вызываемых хлорпромазином.

Особые указания

Предварительной подготовки больных не требуется. При проведении лечения необходимо строгое соблюдение гигиенического режима. Слабительные средства назначают только пациентам со склонностью к запорам вечером (в дни приема пиперазина). Безопасность применения препарата при беременности и лактации не установлена.

Условия хранения

В сухом месте