Инструкция по применению
Пирацезин капсулы 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Беларусь
Производитель: МИНСКИНТЕРКАПС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пирацетам+Циннаризин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 400 мг+25 мг

Описание

Капсулы твердые желатиновые, № 0, цилиндрической формы с полусферическими концами белого цвета (пигмент - титана диоксид). Содержимое капсул - порошок белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Пирацетам+Циннаризин

Состав

Каждая капсула содержит Активные вещества: пирацетам 0,4 г, циннаризина 0,025 г. Вспомогательные вещества: магния субкарбонат, кальция стеарат. Состав капсулы: желатин, глицерин, нипагин, нипазол, натрия лаурилсульфат, вода очищенная, титана диоксид.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Нарушение мозгового кровообращения (ишемический инсульт, восстановительный период после геморрагического инсульта), энцефалопатии различного генеза, интоксикации, травмы головного мозга и другие заболевания центральной нервной системы, сопровождающиеся снижением интеллектуально - мнестических функций, психоорганический синдром с преобладанием признаков астении и адинамии, астенический синдром, лабиринтопатии, синдром Меньера, отставание интеллектуального развития у детей, профилактика мигрени и кинетозов.

Способ применения и дозы

Взрослые: 1-2 капсулы 3 раза в день, в течение 1-3 месяцев (в зависимости от тяжести заболевания), курс лечения 2-3 раза в год. Дети с 5 лет: 1-2 капсулы 1-2 раза в день.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость, почечная или печеночная недостаточность, беременность, период лактации, дети до 5 лет.

Побочные действия

Раздражительность, нарушения сна, тошнота, диспепсия.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает эффекты ноотропных, адаптогенных, гипотензивных препаратов, средств, угнетающих ЦНС (в т.ч. этанола). Улучшает переносимость антипсихотических средств и трициклических антидепрессантов. Ослабляет эффект гипертензивных средств.

Срок хранения после открытия

2 года. Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре (15-25)°С.