Инструкция по применению
Пирантел-Озон Суспензия для приема внутрь 250 мг/ 5 мл 15 мл

Характеристики



Форма выпуска: Суспензия
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пирантел
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 250 мг/5 мл

Описание

Суспензия светло-желтого цвета с характерным запахом. Допускается разделение на жидкий слой и осадок, после взбалтывания образуется однородная суспензия.

Действующее вещество

Пирантел

Состав

Состав на 5 мл : Действующее вещество: пирантела памоат - 721,0 мг, в пересчете на пирантел - 250,0 мг. Вспомогательные вещества: сорбитол некристаллизующийся 70 % - 3605,0 мг, глицерол - 303,5 мг, повидон-К25 - 100,0 мг, магния алюмосиликат -16,5 мг, натрия бензоат -15,0 мг, кармеллоза натрия -15,0 мг,полисорбат 80 -10,0 мг, симетикон (эмульсия) - 2,5 мг, ароматизатор фруктовый - 2,5 мг, лимонной кислоты моногидрат - 1,5 мг, вода очищенная - до 5 мл.

Форма выпуска

Суспензия

Фармакокинетика

Практически не абсорбируется из желудочно-кишечного трака. После приема разовой дозы 10 мг/кг концентрация в плазме крови составляет 0,005-0,13 мкг/мл и достигается в течение 1-3 ч. Метаболизируется частично в печени до N-метил-1,3-пропандиамина. Выведение кишечником - около 93% в неизмененном виде, 7% - почками в неизмененном виде или в виде метаболита.

Показания

Аскаридоз, энтеробиоз, анкилостомидоз (в том числе некатороз).

Способ применения и дозы

Для приема внутрь. Суспензию перед употреблением взбалтывают. 1 мл суспензии содержит 50 мг пирантела. Пирантел можно принимать в любое время суток, не обязательно натощак. До и после приема препарата слабительные средства не применяют. Аскаридоз, энтеробиоз: При энтеробиозе, а также смешанных инвазиях (энтеробиоз и аскаридоз), доза, предназначенная на весь курс (из расчета 10 мг/кг массы тела), применяется однократно. Детям от 6 месяцев до 2 лет: 2,5 мл суспензии (125 мг), Детям с 2 лет с массой тела более 12 кг до 6 лет: 5 мл суспензии (250 мг), Детям от 6 до 12 лет, 10 мл суспензии (500 мг), Детям старше 12 лет и взрослым с массой тела менее 75 кг: 15 мл суспензии (750 мг), Взрослым с массой тела более 75 кг: 20 мл суспензии (1000 мг). Для профилактики повторного заражения рекомендуется повторить прием препарата через 3 недели. При изолированном аскаридозе - 5 мг/кг однократно. Анкилостомидоз: В зонах эндемии, в случае заражения Necator americanus или в случае тяжелого заражения Ancylostoma duodenale, дозировка составляет 20 мг/кг/сутки (за один или два приема) в течение двух-трех дней. В случае заражения Ancylostoma duodenale вне зон эндемии (протекает более легко) применяют в дозе 10 мг/кг за один прием.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к пирантелу и другим компонентам препарата, миастения, печеночная недостаточность, дети до 6 месяцев.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности применяют только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, потеря аппетита, повышение активности "печеночных" трансаминаз. Аллергические реакции: зуд, крапивница, кожная сыпь. Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, слабость, сонливость, бессонница, галлюцинации, спутанность сознания, парестезии. Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения: нарушение слуха. Прочие: гипертермия.

Передозировка

Симптомы: усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное применение левамизола, пиперазина. Повышает концентрацию теофиллина в плазме.

Особые указания

Специальной подготовки и диеты при применении препарата Пирантел не требуется. В случае имеющихся заболеваний печени необходимо предупредить врача. Следует помнить, что перед применением препарата Пирантел, как и любого другого антигельминтного препарата, следует тщательно убрать помещение, вымыть детские игрушки, перед сном и после сна принять душ и сменить нижнее белье. Постельное белье целесообразно в дни лечения и несколько дней после приема препарата проглаживать горячим утюгом. Во избежание повторного заражения необходимо строго соблюдать правила гигиены: мыть руки, подстригать и чистить ногти, не допускать расчесывания области промежности, ежедневно менять постельное и нижнее белье. Тщательная уборка жилых помещений и чистка одежды для уничтожения яиц гельминтов служит- профилактикой реинфекции. Одновременно рекомендуется лечение всех совместно проживающих лиц. Заражение часто может не проявляться никакими симптомами. После завершения лечения необходимо провести контрольное исследование кала на наличие яиц гельминтов.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.