Инструкция по применению
Пирантел Таблетки 250 мг 3 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Оксфорд Лабораториз
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пирантел
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 250 мг



Описание

Овальные двояковыпуклые таблетки желтого цвета с риской на одной стороне.

Действующее вещество

Пирантел

Состав

Каждая таблетка содержит: Активное вещество: пирантела памоат эквивалентного основанию пирантела 250 мг, вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, желатин, тальк очищенный, магния стеарат, натрия карбоксиметилкрахмал.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь пирантел плохо абсорбируется из ЖКТ. После приема разовой дозы 10 мг/кг массы тела концентрация пирантела в плазме составляет 0,005-0,13 мкг /мл в течение 1-3 ч. пирантел, абсорбировавшийся в системный кровоток, частично метаболизируется в печени до N-метил-1,3-пропанедиамина. 50% от принятой дозы выводится в неизмененном виде с калом, около 7% - с мочой в неизмененном виде или в виде метаболита.

Показания

Основными показаниями к применению являются аскаридоз, анкилостомидоз, некатороз и энтеробиоз.

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь во время или после еды и дозировку устанавливают индивидуально в зависимости от возраста и массы тела пациента. Аскаридоз и энтеробиоз, а также смешанные инвазии - однократно в дозе 10 мг/кг массы тела. Возраст - Доза препарата Дети 3 года - 6 лет - 250 мг (1 таб.) Дети 6 лет-12 лет - 500 мг (2 таб.) Дети старше 12 лет и взрослые с массой тела Взрослые с массой тела > 75 кг - 1000 мг (4 таб.) Таблетку следует тщательно разжевать. Анкилостомидоз: препарат назначают из расчета - 10 мг/кг массы тела в сутки в течение 3 дней. Некатороз: при тяжелых формах препарат назначают в дозе из расчета 20 мг/кг массы тела в сутки в течение 2 дней.

Противопоказания

Миастения (период лечения), Детский возраст до 3-х лет (твердая лекарственная форма), Повышенная чувствительность к пирантелу и другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода. При применении в период лактации рекомендуется прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Со стороны ЖКТ и печени: снижение аппетита, возможны тошнота, рвота, диарея, боли в желудке, редко - повышение активности печеночных трансаминаз. Со стороны ЦНС редко - головная боль, головокружение, сонливость, бессонница, слабость, в отдельных случаях - нарушение слуха, галлюцинации, спутанность сознания, парестезии. Прочие: кожная сыпь, крапивница, повышение температуры тела.

Передозировка

Лечение: промывание желудка. Специфического антидота нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Не следует назначать одновременное пиперазином (ослабление действия). При одновременном применении пирантел повышает концентрацию теофиллина в плазме.

Особые указания

После приема пирантела слабительное не назначают. При энтеробиозе следует провести одновременное лечение всех совместно проживающих лиц. После завершения лечения необходимо провести контрольное исследование кала на наличие яиц паразитов. Необходимо тщательное соблюдение гигиены (уборка жилых помещений и чистка одежды для уничтожения яиц гельминтов служит профилактикой реинфекцииВлияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25*С. Хранить в недоступном для детей месте.