Инструкция по применению
Пирантел-Озон Таблетки 250 мг 3 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пирантел
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки желтого с серо-зеленым оттенком цвета, с фаской и риской.

Действующее вещество

Пирантел

Состав

На одну таблетку:Каждая таблетка содержитдействующее вещество: пирантела памоат 721,0 мг, в пересчете на пирантел основание 250,0 мг.вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 24,0 мг, повидон-К25 - 20,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 16,0 мг, крахмал картофельный - 11,0 мг, магния стеарат - 8,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Пирантел очень плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Концентрация препарата в плазме крови, после перорального приема разовой дозы 10 мг/кг массы тела, составляет 0,05-0,13 мкг/мл и достигается в течение 1-3 ч. Отсутствуют данные относительно проникновения препарата через плаценту и в молоко кормящей женщины, а также относительно распределения препарата в тканях и жидкостях организма (теоретически, резорбция препарата является минимальной). Минимальное количество препарата, всосавшегося в ЖКТ, частично метаболизируется в печени до N-метил-1,3-пропандиамина.Около 93% пероральной дозы препарата выводится кишечником в неизменном виде, и не более 7% почками в неизмененном виде или в виде метаболита N-метил-1,3-пропандиамина.

Показания

АскаридозЭнтеробиозАнкилостомидозНекаторозТрихоцефалез

Способ применения и дозы

Внутрь.Препарат применяется во время или после еды, тщательно разжевывая таблетку, запивая 1 стаканом воды.Если не назначена другая схема лечения, в зависимости от возраста и массы тела пациента, рекомендуются следующие дозировки:Возраст пациента/Таблетки 250 мг/мг:3-6 лет/1/250,6-12 лет/2/500,старше 12 лет и взрослые массой тела до 75 кг/3/750,Взрослые с массой тела более 75 кг/4 /1000.Для профилактики повторного заражения допускается повторение курса через 3 недели после первого приема.При аскаридозе и энтеробиозе, а также смешанных инвазиях этими паразитами, доза, предназначенная на весь курс (из расчета - 10 мг /кг), применяется однократно.При анкилостомидозе, сочетании некатороза с аскаридозом или других сочетанных гельминтных поражениях пирантел применяют в течение 3-х дней по 10 мг/кг в сутки.При массивных инвазиях Necator americanus рекомендуемая доза по 20 мг/кг массы тела в течение 2-х дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к пирантелу и другим компонентам препарата, Миастения (период лечения),Печеночная недостаточность,Одновременный прием с пиперазином и левамизолом,Детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременностиОтсутствуют контролируемые исследования применения пирантела у беременных женщин, поэтому препарат следует применять только в том случае, если потенциальная польза для матери, превышает возможный риск для плода.Применение в период грудного вскармливанияОтсутствуют данные о безопасности применения препарата у кормящих женщин, поэтому следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания на время лечения препаратом.

Побочные действия

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, потеря аппетита, повышение активности 'печеночных' трансаминаз.Аллергические реакции: зуд, крапивница, кожная сыпь.Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, слабость, сонливость, бессонница, галлюцинации, спутанность сознания, парестезии.Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения: нарушение слуха.Прочие: повышенная температура тела.

Передозировка

Симптомы: усиление дозозависимых побочных эффектов.Лечение: симптоматическая терапия. Специфический антидот отсутствует.

Взаимодействие с другими препаратами

Пирантел не рекомендуется применять одновременно с пиперазином, левамизолом. Эти средства действуют антагонистически.Пирантел повышает концентрацию теофиллина в плазме.

Особые указания

После приема препарата Пирантел слабительные не назначают.При лечении энтеробиоза одновременно должны лечиться все совместно проживающие лица. Тщательное соблюдение гигиены (уборка жилых помещений и чистка одежды для уничтожения яиц гельминтов) служит профилактикой реинфекций. Через 14 дней после лечения препаратом Пирантел следует провести контрольные паразитологические исследования.В случае заболеваний печени следует предупредить врача.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Учитывая возможные побочные эффекты со стороны нервной системы во время применения препарата, необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.