Инструкция по применению
Пироксикам-Промед Капсулы 20 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Промед
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пироксикам
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 20 мг

Действующее вещество

Пироксикам

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Ревматоидный артрит, остеоартроз, спондилиты, острый приступ подагры, воспалительные заболевания костно-мышечной системы.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 20 — 40 мг в день в 1–2 приема.

Противопоказания

Гиперчувствительность, в т.ч. к НПВС, язвенная болезнь, нарушения кроветворения, заболевания печени и почек, сердечно-сосудистая недостаточность, бронхиальная астма, беременность, кормление грудью (следует приостановить грудное вскармливание).

Побочные действия

Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, отеки, головная боль, головокружение, сонливость, аллергические кожные реакции.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, абдоминальная боль, сонливость, летаргия; кровотечение из ЖКТ, повышение АД, острая почечная недостаточность, угнетение дыхания, кома. Лечение: симптоматическое. Специфического антидота нет. При недавней передозировке необходимо вызвать рвоту, принять осмотические слабительные, активированный уголь (60-100 г взрослым, детям - 1-2 г/кг). Многократное применение активированного угля (через 6 ч после приема) снижает T1/2 пироксикама на 50% и его биодоступность на 37%. Форсированный диурез, защелачивание мочи, гемодиализ и гемоперфузия неэффективны (высокая связь с белками плазмы).

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает эффект пероральных антикоагулянтов, повышает концентрацию солей лития в крови. Алкоголь увеличивает вероятность побочных проявлений. Уровень в крови снижают производные салициловой кислоты.

Особые указания

Пироксикам должны назначать врачи, имеющие опыт в диагностике и лечении воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов. Одновременный прием с мизопростолом, ингибиторами протонного насоса, блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов снижает желудочно-кишечную токсичность. НПВП, включая пироксикам, могут вызвать тяжелые побочные со стороны ЖКТ, включая кровотечение, изъязвление и перфорацию желудка, тонкой и толстой кишки (в т.ч. с летальным исходом). Данные явления могут возникнуть в любое время лечения и даже не сопровождаться угрожающими симптомами. Риск возникновения данных явлений особенно высок для пироксикама; повышается у пожилых. Прием пироксикама существенно повышает риск тяжелых кожных реакций (эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз) особенно на ранних сроках лечения. При возникновении первых признаков сыпи, изъязвления слизистых оболочек или др. признаков гиперчувствительности пироксикам немедленно отменяют. Пироксикам, как и др. НПВП, повышает риск тромботических осложнений (в т.ч. инфаркта миокарда и инсульта), пациентам с факторами риска данные препараты назначают с осторожностью. Пироксикам, как и др. НПВП, могут способствовать возникновению артериальной гипертензии или ухудшать ее течение. У женщин возможно снижение контрацептивного эффекта ВМК из-за влияния пироксикама на тонус миометрия. Во время лечения следует исключить употребление этанола. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии др. потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре 15–25 °C.