Инструкция по применению
Плацента композитум раствор для внутримышечного введения ампулы 2,2 мл 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 100



Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Placenta suis (плацента суис) D6 22 мкл, Embryo suis (эмбрио суис) D8 22 мкл , Vena suis (вена суис) D8 22 мкл, Arteria suis (артерия суис) D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10 22 мкл, Hypophysis suis (гипофизис суис) D10 22 мкл, Secale cornutum (секале корнутум) D4 22 мкл, Acidum sarcolacticum (Acidum L (+)lacticum) (ацидум сарколяктикум (ацидум L(+)ляктикум)) D4 22 мкл, Nicotiana tabacum (Tabacum) (никотиана табакум (табакум)) D10 22 мкл, Strophanthus gratus (Strophanthus) (строфантус гратус (строфантус)) D6 22 мкл, Aesculus hippocastanum (Aesculus) (эскулюс гиппокастанум (эскулюс)) D4 22 мкл, Melilotus officinalis (мелилотус оффициналис) D6 22 мкл, Cuprum sulfuricum (купрум сульфурикум) D6 22 мкл, Natrium pyruvicum (натриум пирувикум) D8 22 мкл, Barium carbonicum (бариум карбоникум) D13 22 мкл, Plumbum jodatum (плюмбум йодатум) D18 22 мкл, Vipera berus (випера берус) D10 22 мкл, Solanum nigrum (солянум нигрум) D6 22 мкл;

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Показания

В комплексной терапии атеросклероза сосудов головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии.

Способ применения и дозы

Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы) внутримышечно через день. Средний курс лечения составляет 3 недели. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °C до 25 °C.