Инструкция по применению
Плацента композитум Раствор для внутримышечного введения гомеопатический 2,2 мл ампулы 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 5
Срок годности: 60.0

Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии атеросклероза сосудов головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): Активные компоненты: Placenta suis (плацента суис) D6 22 мкл, Embryo suis (эмбрио суис) D8 22 мкл , Vena suis (вена суис) D8 22 мкл, Arteria suis (артерия суис) D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10 22 мкл, Hypophysis suis (гипофизис суис) D10 22 мкл, Secale cornutum (секале корнутум) D4 22 мкл, Acidum sarcolacticum (ацидум сарколяктикум) D4 22 мкл, Nicotiana tabacum (никотиана табакум) D10 22 мкл, Strophanthus gratus (строфантус гратус) D6 22 мкл, Aesculus hippocastanum (эскулюс гиппокаштанум) D4 22 мкл, Melilotus officinalis (мелилотус оффициналис) D6 22 мкл, Cuprum sulfuricum (купрум сульфурикум) D6 22 мкл, Natrium pyruvicum (натриум пирувикум) D8 22 мкл, Barium carbonicum (бариум карбоникум) D13 22 мкл, Plumbum jodatum (плюмбум йодатум) D18 22 мкл, Vipera berus (випера берус) D10 22 мкл, Solanum nigrum (солянум нигрум) D6 22 мкл, Вспомогательные вещества: вода для инъекций 1804 мг, натрия хлорид для установления изотонии.

Форма выпуска

Раствор

Показания

В комплексной терапии атеросклероза сосудов головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии.

Способ применения и дозы

Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы) внутримышечно через день. Средний курс лечения составляет 3 недели. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания щитовидной железы. Возраст до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Условия хранения

В сухом месте