Инструкция по применению
Пластырь перцовый 10 х 18 см

Характеристики

Форма выпуска: Пластырь
Страна: Россия
Производитель: Новосибхимфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: экстракт перца стручкового густой
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Полоска ткани с перфорацией или без перфорации (бязь, мадаполам, миткаль, полотно из вискозной пряжи или импортная ткань, зарегистрированная в РФ) с равномерным слоем пластырной массы от желто-бурого до коричневого цвета, своеобразного запаха, покрытая сверху защитным слоем из пленки полиэтилентерефталатной или импортной, зарегистрированной в РФ, или из бумаги силиконизированной или импортной, зарегистрированной в РФ, или пленки полиэтиленовой импортной, зарегистрированной в РФ, или две полоски ткани на одном защитном слое. Перцовый пластырь не должен иметь складок ткани, комков массы, посторонних механических включений в массе и непокрытых пластырной массой мест. Перцовый пластырь выпускают следующих размеров: Ширина, см Длина, см 4,0 ± 0,2 10,0 ± 0,2 6,0 ± 0,2 10,0 ± 0,2 10,0 ± 0,3 18,0 ± 0,5 12,0 ± 0,3 18,0 ± 0,5

Действующее вещество

экстракт перца стручкового густой

Состав

Состав перцовой массы 1 Активные вещества: экстракт красавки густой - 600 мг, экстракт стручкового перца густого в пересчете на сухой - 8 г Вспомогательные вещества: каучук натуральный Смокед-шит - 21,5 г, каучук синтетический СКС-30АРКПН - 21,5 г, присадка антиокислительная 4-метил-2,6- дитретичный бутилфенол (Агидол-1)- 600 мг, канифоль сосновая- 22,2 г, ланолин безводный - 18,6 г, вазелиновое масло медицинское - 2 г, цинка оксид - 5 г. Состав перцовой массы 2 Активные вещества: экстракт красавки густой - 600 мг, экстракт стручкового перца густого в пересчете на сухой - 8 г Вспомогательные вещества: каучук натуральный Смокед-шит - 20,5 г, каучук синтетический СКС-30АРКПН - 20,5 г, присадка антиокислительная 4-метил-2,6- дитретичный бутилфенол (Агидол-1)- 600 мг, канифоль сосновая- 22,2 г, ланолин безводный - 18,6 г, вазелиновое масло медицинское - 2 г, цинка оксид - 5 г, димексид - 1 г, эвкалиптовое масло - 1 г. Допускается в состав перцовой массы 1 и состав перцовой массы 2 вместо каучука синтетического СКС-30АРКПН вносить каучук натуральный Смокед- шит.

Форма выпуска

Пластырь

Показания

Радикулит, миозит, люмбаго, артралгия.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед наложением пластыря кожу обезжиривают спиртом, эфиром и протирают насухо. С пластыря снимают защитную пленку, предохраняющую клейкую сторону, накладывают на кожу, слегка прижимают и разглаживают. Пластырь можно не снимать в течение двух суток, если не ощущается сильного раздражения. При сильном жжении пластырь снимают и кожу смазывают кремом. Если на коже остались следы клейкой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах прикрепления пластыря.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не запрещено применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, жжение в области аппликации.

Условия хранения

В сухом месте