Инструкция по применению
Пластырь перцовый Мультипласт перфорированный 6х10 см 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Пластырь
Страна: Россия
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Экстракт перца красного, полученный из плодов перца стручкового входящий в состав пластырной массы Перцового пластыря, действует местно, не попадает в системный кровоток. Оказывает согревающее, отвлекающее, успокаивающее действие, обеспечивая тем самым глубокое прогревание, снижение и облегчение боли, снятие перенапряжения и восстановление после растяжений. При простудных заболеваниях, сопровождающихся кашлем, пластырь за счет согревающих свойств стимулирует выведение мокроты.

Состав

Активные компоненты: экстракт растительный пищевой перца красного ЧилиМатериал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная,Клеевой слой (пластырная масса): термоплавкий клей, ланолин безводный, экстракт растительный пищевой перца красного Чили,Защитное покрытие: материал антиадгезионный – бумага силиконизированная.

Форма выпуска

Пластырь

Показания

Пластырь перцовый используется для облегчения мышечной, суставной и невралгической болей (при миозите, артрите, радикулите, невралгии, люмбаго), при растяжении и напряжении мышц, при простудных заболеваниях.

Способ применения и дозы

Только для однократного наружного применения. Перед наложением пластыря кожу обезжиривают и протирают насухо. С пластыря снимают защитное покрытие, предохраняющее клейкую сторону, накладывают на кожу, слегка прижимают и разглаживают.При фиксации пластыря на коже появляется чувство теплоты.Пластырь можно не снимать в течение двух суток, если не ощущается сильного раздражения.В случае возникновения жжения в области аппликации необходимо снять пластырь и смазать кожу кремом.Если на коже остались следы клейкой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов пластыря, нарушение целостности кожного покрова в местах прикрепления пластыря (ссадины, порезы, раны и язвы), кожные заболевания (нейродермит, мокнущая экзема, псориаз), гнойные заболевания кожи, присутствие на кожном покрове обширных родимых пятен, бородавок, родинок и других новообразований, варикозное расширение вен, детский возраст до 14 лет.С осторожностью препарат используют при вегетососудистых заболеваниях.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение медицинского изделия Пластырь перцовый противопоказано у беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей в возрасте до 14 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, гиперемия, зуд и жжение в области аппликации.

Взаимодействие с другими препаратами

Не применять одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи.

Особые указания

Исследование применения медицинского изделия у людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.Исследование применения медицинского изделия у людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.