Инструкция по применению
Перцовый Пластырь Доктор Перец перфорированный 10 х 18 см 4 шт

Характеристики

Форма выпуска: Пластырь
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 4



Описание

Перцовый пластырь – одно из эффективных и безопасных местных средств лечения многих заболеваний. Сам пластырь собой представляет хлопчатобумажную ткань с нанесенными на нее экстрактами стручкового перца, экстракта красавки.

Состав

Состав пластырной массы - каучук натуральный Смокед-шит, каучук синтетический, присадка антиокислительная 4-метил-2,6-дитретичный бутилфенол (Агидол-1), канифоль сосновая, ланолин безводный, масло вазелиновое медицинское, мука пшеничная, белила цинковые (окись цинка), красавки экстракт густой, плоды перца стручкового; основа для нанесения пластырной массы - ткань хлопчатобумажная; защитное покрытие - материал антиадгезионный или бумага силиконизированная, или пленка полиэтилентерефталатная.

Форма выпуска

Пластырь

Показания

Лечение болевых синдромов. Радикулит, миозит, невралгия, люмбаго, артралгия.

Способ применения и дозы

Перед наложением пластыря кожу обезжиривают спиртом и протирают ее насухо. С пластыря снимают антиадгезионный защитный слой, предохраняющий клейкую сторону, накладывают на кожу, слегка прижимают и разглаживают. Пластырь можно не снимать в течение двух суток, если не ощущается сильного раздражения. При сильном жжении пластырь снимают и кожу смазывают кремом. Повторное нанесение нового пластыря на то же самое место возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клейкой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания

Нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения, гиперчувствительность к любому из компонентов препарата. "Аспириновая" астма, беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Аллергические реакции: крапивница, ангионевротический отек, в редких случаях злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), бронхоспастический синдром, анафилактический шок.

Передозировка

При применении пластыря более 2-х дней возможна ожоговая реакция в месте прикрепления.

Срок хранения после открытия

2 года. Не следует использовать препарат по истечении срока годности.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте. Хранить в недоступном для детей месте.