Инструкция по применению
Плюща Сироп 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Экстракт листьев плюща
Количество в упаковке: 1



Описание

Густоватая жидкость от светло-желтого до желтовато-коричневого цвета со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Экстракт листьев плюща

Состав

Состав на 100 мл препарата Активный компонент Плюща обыкновенного листьев экстракт* - 0,8000 г (Плюща обыкновенного листьев экстракт густой) с содержанием гедеракозида С в пересчете на сухое вещество 6,75 % Вспомогательные вещества Макрогола глицерилгидроксистеарат - 0,5000 г (Полиоксил-40-гидрогенизированное касторовое масло) Анисовое масло эфирное - 0,0150 г Гидроксиэтилцеллюлоза (гиэтеллоза) - 0,1500 г Сорбитол жидкий (некристаллизующийся) - 50,0000 г Пропиленгликоль - 13,8770 г Глицерол (глицерин) - 10,0000 г Вода очищенная - 39,9605 г *Плюща обыкновенного листьев экстракт (Плюща обыкновенного листьев экстракт густой) получают из листьев плюща обыкновенного - Hedera helix L., семейство аралиевые - Araliaceae (Евр. Ф., "Плюща листья") экстракцией смесью: спирт 50 % - пропиленгликоль (98 : 2, масс.) при соотношении сырья и конечного продукта (2,2-2,9) : 1.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Препарат представляет собой экстракт из лекарственного растительного сырья (листьев плюща), содержащий сложный комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. Перед применением содержимое флакона следует взбалтывать. Грудным детям до 1 года - по 2,5 мл 1 раз в день. Детям от 1 года до 4 лет - по 2,5 мл 3 раза в день. Детям от 4 до 10 лет - по 2,5 мл 4 раза в день. Взрослым и детям старше 10 лет - по 5 мл 3 раза в день. Взрослым и подросткам препарат рекомендуется принимать неразбавленным. Грудным и маленьким детям препарат рекомендуется давать разбавленным в небольшом количестве воды. Длительность применения препарата зависит от тяжести заболевания, но должна составлять не менее 7 дней. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжить лечение препаратом в течение 2-3 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства аралиевых. Непереносимость фруктозы, недостаточность аргининсукцинат-синтетазы, беременность и период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, в редких случаях - боли в эпигастральной области. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны тошнота, рвота, диарея, гастроэнтерит. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата. В случае отсутствия лечебного эффекта на фоне приема препарата в течение 4-5 дней или ухудшения состояния пациента (появление приступов удушья, гнойной мокроты, повышение температуры), следует немедленно обратиться к врачу. Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что одна чайная ложка сиропа (5 мл) содержит 1,75 г сорбитола (соответствует 0,44 г фруктозы), что соответствует 0,15 ХЕ.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.