Инструкция по применению
Полидекса Капли ушные 10,5 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Франция
Производитель: Лабораторуар Фармастер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество:
Дексаметазон+Неомицин+Полимиксин В
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10 мг+10000
ЕД+1 мг/1 мл
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Дексаметазон+Неомицин+Полимиксин В

Состав

На 100 мл Действующие вещества: неомицина сульфат 1г, что соответствует 650 000 МЕ, Полимиксина В сульфат 1 000 000 МЕ, дексаметазон натрий метасульфобензоат 0,100 г.Вспомогательные вещества: тиомерсал, лимонная кислота, 1N раствор гидроксида натрия, макроголь 400, полисорбат 80, очищенная вода q.s. до 100 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Системная абсорбция отсутствует, кроме случаев перфорации барабанной перепонки

Показания

Наружный отит (в частности, инфицированная экзема наружного слухового прохода)

Способ применения и дозы

Препарат назначают по 1-5 капель в каждое ухо 2 раза/сут в течение 6-10 дней.Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон, подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо. После закапывания препарата в одно ухо следует наклонить голову в противоположную сторону на несколько минут, а затем закапать в другое ухо

Противопоказания

Инфекционные или травматические повреждения барабанной перепонки;— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

При длительном лечении беременных женщин возникает риск ототоксического действия на плод

Побочные действия

Аллергические реакции: редко - кожные проявления

Передозировка

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток Передозировка маловероятна

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия препарата Полидекса с другими лекарственными средствами не выявлено

Особые указания

Перед началом лечения необходимо исследовать состояние барабанной перепонки. При перфорации барабанной перепонки применение препарата недопустимо в связи с риском токсического воздействия на вестибулярный и слуховой аппарат.При аллергии на неомицин возможна перекрестная аллергия с антибиотиками-аминогликозидами

Условия хранения

Беречь от детей