Инструкция по применению
Полифильтрин Таблетки 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: В-МИН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лигнин гидролизный
Количество в упаковке: 50

Описание

Полифильтрин ®Биологически активная добавка к пищеЭнтеросорбент.

Действующее вещество

Лигнин гидролизный

Состав

Одна таблетка содержит 400 мг лигнина гидролизного.Вспомогательные веществакрахмал картофельный (наполнитель), диоксид кремния (агент антислеживающий), кальция стеарат или магния стеарат (агент антислеживающий). Лигнин — сложное полимерное соединение, содержащееся в клетках растений и некоторых водорослей. В медицине гидролизный лигнин используется в качестве энтеросорбента. Энтеросорбенты на основе лигнина связывают различные микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности, токсины экзогенной и эндогенной природы, аллергены, ксенобиотики, тяжелые металлы, радиоактивные изотопы, аммиак, двухвалентные катионы и выводятся через кишечник в неизмененном виде (не метаболизируются после проникновения в желудочно-кишечный тракт). Лигнин способствует компенсации недостатка естественных пищевых волокон, положительно влияет на микрофлору толстого кишечника и на общую резистентность организма. Пищевая ценность в 100 г продукта (1 таблетка): пищевые волокна — 87 г (0,36 г), углеводы — 8,9 г (0,04 г).Энергетическая ценность ккал/кДж / 100 г (1 таблетка): 195 (0,88) / 790 (3,56).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, источника нерастворимых пищевых волокон (лигнина).

Способ применения и дозы

взрослым по 3–4 таблетки 3 раза в день за 1 час до еды, запивая питьевой водой. Продолжительность приема — 7 дней.

Противопоказания

лицам до 18 лет, индивидуальная непереносимость компонентов БАД, острая кишечная непроходимость, обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, беременность, период лактации. Перед применением БАД рекомендуется проконсультироваться с врачом.Область применениярекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, источника нерастворимых пищевых волокон (лигнина). БАД, не является лекарством.Содержание в суточной дозе, от адекватного уровня потребления* (12/9 таблеток): 4 320 мг (21 %) / 3240 мг (16,2 %).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Особые указания

БАД. Не является лекарством.

Условия хранения

хранить в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С.