Инструкция по применению
Полинадим Капли глазные 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Дифенгидрамин+Нафазолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1 мг+250 мкг/1 мл
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Дифенгидрамин+Нафазолин

Состав

В 1 мл. раствора : Дифенгидрамин 1 мг; нафазолин 250 мкг.Вспомогательные вещества: борная кислота - 15 мг, натрия тетрабората декагидрат натрия тетраборнокислый 10-водный - 500 мкг, динатрия эдетат (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, трилон Б) - 600 мкг, метилцеллюлоза водорастворимая - 1.5 мг, вода д/и (до 1 мл).

Форма выпуска

Капли

Показания

Острый аллергический конъюнктивит (в т.ч. поллинозный конъюнктивит);— конъюнктивит при лекарственной аллергии;— инфекционные заболевания глаз с острым аллергическим компонентом (в качестве дополнительного средства).

Способ применения и дозы

Взрослым при острых симптомах препарат назначают по 1 капле в конъюнктивальный мешок каждые 3 ч до уменьшения отека и раздражения глаз, затем - по 1 капле 2-3 раза/сут до исчезновения клинических симптомов.Детям старше 2 лет назначают 1-2 капли/сут.Продолжительность лечения - не более 5 дней. Необходимость более длительного применения препарата врач решает индивидуально.При сохранении симптомов раздражения конъюнктивы более 72 ч следует прекратить применение препарата.

Противопоказания

Ксероз конъюнктивы (сухой кератоконъюнктивит, синдром Шегрена);— одновременное применение с ингибиторами МАО и период в течение 10 дней после их отмены;— закрытоугольная глаукома;— беременность;— период лактации;— детский возраст до 2 лет;— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Местные реакции: симптомы раздражения конъюнктивы (жжение в области глаз, гиперемия конъюнктивы, зуд), а также нарушение зрения, повышение внутриглазного давления, мидриаз, боль в глазах, сухость слизистой оболочки носа. Эти реакции исчезают после отмены препарата. Описан единичный случай помутнения роговицы (при применении в течение 7 дней не менее 10 раз/сут), которое исчезло после прекращения лечения препаратом.Системные реакции: редко (особенно у детей и пациентов пожилого возраста) - бледность кожных покровов, тахикардия, боли в области сердца, повышение АД, усиление потоотделения, дрожь, головная боль, возбуждение, тошнота, сонливость, головокружение.

Передозировка

При местном применении препарата передозировка маловероятна.Симптомы: у детей в возрасте до 6 лет при длительном и частом применении возможно угнетение ЦНС, гипотермия, длительный мидриаз, повышение АД, тахикардия.Лечение: проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с трициклическими антидепрессантами возможно усиление сосудосуживающего действия нафазолина.Применение ингибиторов МАО одновременно с нафазолином или в течение 10 дней после их отмены может привести к гипертоническому кризу.

Особые указания

Не следует применять препарат чаще, чем через каждые 3 ч (в течение 5 дней). Препарат не предназначен для приема внутрь или введения в виде инъекций.В случае появления симптомов, свидетельствующих о системном всасывании, необходимо прекратить применение препарата.При симптомах аллергии и во время лечения препаратом не рекомендуется использовать мягкие контактные линзы. Если их применение необходимо, то линзы следует снимать перед инстилляцией и устанавливать обратно, не ранее чем через 15 мин.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:Поскольку после инстилляции временно нарушается четкость зрения, сразу после применения препарата пациентам следует воздерживаться от вождения автотранспорта и деятельности, требующей четкости зрения.

Условия хранения

Беречь от детей