Инструкция по применению
Полиоксидоний Таблетки 12 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Петровакс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Азоксимера бромид
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 12 мг



Действующее вещество

Азоксимера бромид

Состав

1 таб. содержит: Действующее вещество: Азоксимера бромид – 12 мг; Вспомогательные вещества: маннитол – 3,6 мг, повидон К 17 – 2,4 мг, лактозы моногидрат – 185,0 мг, крахмал картофельный – 45,0 мг, стеариновая кислота – 2,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание:Полиоксидоний после приема внутрь быстро всасывается из ЖКТ, биодоступность составляет примерно 50%. Cmax в плазме крови достигается через 3 ч после приема внутрь. Фармакокинетика препарата является линейной (концентрация в плазме крови пропорциональна принятой дозе).Распределение:Полиоксидоний является гидрофильным соединением. Кажущийся Vd составляет примерно 0.5 л/кг, что говорит о том, что препарат распределяется в основном в межклеточной жидкости. Период полуабсорбции 35 мин. Не кумулирует.Метаболизм и выведение:В организме гидролизуется до олигомеров, которые выводятся преимущественно почками. T1/2 - 18 ч.

Показания

Лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний (вирусной, бактериальной и грибковой этиологии), не поддающихся стандартной терапии, как в стадии обострения, так и в стадии ремиссии, у взрослых и детей старше 3x лет. В составе комплексной терапии:- острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания ротоглотки, околоносовых пазух, верхних отделов дыхательных путей, внутреннего и среднего уха;- аллергические заболевания, осложненные рецидивирующей бактериальной, грибковой и вирусной инфекцией (в т. ч. поллиноз, бронхиальная астма);- для реабилитации часто и длительно (более 4-5 раз в год) болеющих лиц.В виде монотерапии:- профилактика рецидивирующей герпетической инфекции;- сезонная профилактика обострений хронических очагов инфекций ротоглотки, околоносовых пазух, верхних дыхательных путей, внутреннего и среднего уха;- у иммунокомпрометированных лиц для профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций в предэпидемический период;- для коррекции вторичных иммунодефицитов, возникающих вследствие старения или воздействия неблагоприятных факторов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период лактации противопоказано (клинический опыт применения отсутствует).Экскреция азоксимера бромида с грудным молоком не изучалась.

Побочные действия

О побочном действии препарата Полиоксидоний не сообщалось.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Полиоксидоний не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие не установлено.Полиоксидоний совместим с антибиотиками, противовирусными, противогрибковыми и антигистаминными препаратами, бронхолитиками, ГКС, цитостатиками, бета-адреномиметиками.

Особые указания

Не следует превышать указанные дозы и длительность курса лечения.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.Препарат не оказывает влияния на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.