Инструкция по применению
Полисорб МП Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь банка 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Страна: Россия
Производитель: Полисорб
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кремния диоксид коллоидный
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Кремния диоксид коллоидный

Состав

Полисорб; МП - неорганический неселективный полифункциональный энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема с размерами частиц до 0.09 мм и с химической формулой SiO2. Полисорб; МП обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. В просвете ЖКТ препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая патогенные бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, алкоголь. Полисорб; МП сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в т.ч. избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза.

Форма выпуска

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

Показания

ПОЛИСОРБ ПРИНИМАЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ: **МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ОБШИРНЫ:**

Способ применения и дозы

КАК И СКОЛЬКО ПРИНИМАТЬ? _Таблица подсчета суточной дозы Полисорба в зависимости от массы тела пациента: _ Вес пациента / Дозировка / Объем воды до 10 кг / 0,5-1,5 чайные ложки в сутки / 30-50 мл 11-20 кг / 1 чайная ложка «без горки» на 1 прием / 30-50 мл 21-30 кг / 1 чайная ложка «с горкой» на 1 прием / 50-70 мл 31-40 кг / 2 чайные ложки «с горкой» на 1 прием / 70-100 мл 41-60 кг / 1 столовая ложка «с горкой» на 1 прием / 100 мл более 60 кг / 1-2 столовые ложки «с горкой» на 1 прием / 100-150 мл 1 чайная ложка Полисорба «с горкой» содержит 1 грамм препарата.1 грамм — наиболее рекомендуемая разовая детская дозировка. 1 столовая ложка Полисорба «с горкой» содержит 2,5-3 грамма препарата.3 грамма — средняя разовая взрослая дозировка. **Способ применения Полисорба при основных показаниях** **Заболевание / Способ применения / Особенности приема / Кол-во приемов / Длительность** **Пищевая аллергия:** Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды Пить перед едой 3 раза в день 3-5 дней **Хроническая аллергия, крапивница, поллиноз, атопия:** Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды Пить перед едой 3 раза в день 10-14 дней **Отравление:** Промываниежелудка с 0,5-1% раствором полисорб МП((2-4 столовые ложки на 1 литр воды) Далее –прием внутрь взвеси полисорба МП в возрастной дозе 3 раза в день 3-5 дней **Кишечные инфекции:** Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-1/2 стакана воды: 1 сутки – принимать через каждый час.2 сутки – четыре раза в сутки по дозе. Прием в составе комплексного лечения 3-4 раза в день 5-7 дней **Вирусный гепатит: ** С первых дней болезниРастворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды Прием в составе комплексного лечения 3-4 раза в день 7-10 дней **Очищение организма:** Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды За час до еды или через час после еды 3 раза в день 7-14 дней **Хроническая почечная недостаточность:** Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды Прием в составе комплексного лечения 3-4 раза в день 25-30 дней **Токсикоз беременных:** Растворить порошок в возрастной дозе в ¼-½ стакана воды За час до еды или через час после еды 3 раза в день 10-14 дней **Похмелье:** 1 сутки – принимать 5 раз в день через час.2 сутки – принимать 4 раза в день через час. Пить больше жидкости 1 сутки – 5 раз.2 сутки – 4 раза. 2 дня **Профилактикапохмелья:** Принять по 1 дозе: до застолья, перед сном после застолья, наутро. 1 раз в день 3 дня Редко возникают запоры, для их профилактики следует пить больше воды. Аллергические реакции возможны. При длительном приеме (более 14 дней) возможно нарушение всасывания

витаминов и кальция, что корректируется приемом поливитаминов и кальция. Полисорб принимают либо за 1 час до приема лекарств/пищи, либо через 1 час после приема лекарств/пищи. Независимо от показания препарат всегда перед применением размешивается в чистой воде комнатной температуры (количество воды и препарата варьируется от возраста). Кроме того, допустимо использовать грудное молоко, сок без мякоти, морс или добавить в воду сок лимона и т.д. У детей грудного возраста допустимо использовать меньший объем воды 15-25 мл (в отличие рекомендованного 30-50 мл) для размешивания препарата, а остальным объемом воды (до 50-100 мл) ребенка необходимо допоить. У взрослых – перед приемом препарат размешивается в ½-1 стакане воды. При приеме препарата стоит соблюдать повышенный питьевой режим (если нет ограничений со стороны врача) – до 2,5-3 л воды в день.

Противопоказания

* Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в фазе обострения; * Кровотечения из желудочно-кишечного тракта; * Атония кишечника; * Индивидуальная непереносимость препарата.

Условия хранения

Беречь от детей