Инструкция по применению
Полижинакс Капсулы вагинальные 6 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Innothera Chouzy
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Неомицин+Нистатин+Полимиксин B
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 35 000 МЕ+35 000 МЕ+100 000 МЕ
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Неомицин+Нистатин+Полимиксин B

Состав

Действующее вещество: Неомицин + Нистатин + Полимиксин B (Neomycin + Nystatin + Polymyxin B)Концентрация действующего вещества (од): Неомицина сульфат 35 000 МЕ, полимиксина B сульфат 35 000 МЕ, нистатин 100 000 МЕ

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Равномерно распределяется на слизистой оболочке влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой оболочки влагалища.

Показания

Лечение неспецифических, грибковых, смешанных вагинитов, вульвовагинитов и цервиковагинитов; Предоперационная профилактика инфекционных осложнений при гинекологических вмешательствах; до и после диатермокоагуляции шейки матки; перед внутриматочными диагностическими процедурами; перед родами.

Способ применения и дозы

Лежа на спине, 1 капсулу вводят глубоко во влагалище вечером перед сном. Курс лечения - 12 дней. Профилактический курс - 6 дней.В случае пропуска одной или нескольких доз следует возобновить лечение в обычной дозе.

Противопоказания

I триместр беременности; период лактации; повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического анализа.Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса.Не следует прерывать курс лечения во время менструации.Пациент должен быть предупрежден о необходимости сообщить лечащему врачу об усугублении любых из указанных в инструкции побочных эффектов или о появлении других побочных эффектов, не указанных в инструкции.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять траспортными средствами и другими механизмами.

Побочные действия

Не рекомендуется использовать Полижинакс одновременно со спермицидами, т.к. возможно снижение активности препарата.

Передозировка

Возможны: аллергические реакции, жжение, зуд, раздражение во влагалище; аллергическая контактная эритема.При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности

Особые указания

В настоящее время о случаях передозировки препарата Полижинакс не сообщалось.

Условия хранения

Беречь от детей