Инструкция по применению
Полудан лиофилизат для гл капель 100ед флакон N1

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: ЛЭНС-ФАРМ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Полиадениловая кислота+Полиуридиловая кислота
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 100 ЕД

Описание

Лиофилизат для приготовления глазных капель Полудан - биосинтетический полирибонуклеотидный комплекс полиадениловой и полиуридиловой кислот (в эквимолярных соотношениях). Индуктор синтеза эндогенного интерферона. Стимулирует образование в основном альфа-интерферона, в меньшей степени -бета-и гамма-интерферонов. Обладает выраженной противовирусной и иммуномодулирующей активностью.

Действующее вещество

Полиадениловая кислота+Полиуридиловая кислота

Состав

Комплекс полиадениловой и полиуридиловой кислот 100 ЕД , в т.ч. полирибоадениловой кислоты калиевая соль (калия полирибоаденилат) 100 мкг в т.ч. полирибоуридиловой кислоты калиевая соль (калия полирибоуридилат) 107 мкг. Вспомогательные вещества: гидрофосфат натрия (натрий фосфорнокислый 2-замещенный), дигидрофосфат калия (калий фосфорнокислый 1-замещенный безводный), хлорид натрия.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Полудан назначают взрослым и детям при вирусных заболеваниях глаз: аденовирусный и герпетический конъюнктивит, поверхностный кератоконъюнктивит, кератит.

Способ применения и дозы

Местно. Раствор Полудана, предназначенный для инсталляций в глаз, готовят путем растворения содержимого флакона в 2 мл воды для инъекций. Готовый раствор может быть использован в течение 7 дней, при условии хранения в холодильнике. Применение у взрослых: закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 6-8 раз/ По мере стихания воспалительных явлений число инстилляций сокращают до 3-4 раз/ Применение у детей: закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 3-4 По мере стихания воспалительных явлений число инстилляций сокращают до 1-2 раз/ При отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом на предмет субконъюнктивальных инъекций препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат совместим с антибиотиками и средствами традиционного лечения вирусных заболеваний.При одновременном применении Полудана с ферментными препаратами в связи с разрушающим действием ферментов на эндогенный интерферон, клиническая эффективность Полудана уменьшается.

Особые указания

Побочные явления исчезают самостоятельно после отмены препарата в течение 1-3 сут. В терапевтических дозах Полудан не обладает пирогенностью.