Инструкция по применению
Полыни настойка 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Полыни горькой трава
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Описание

Прозрачная жидкость от коричневато-зеленого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом.

Действующее вещество

Полыни горькой трава

Состав

Для получения настойки используют:Полыни горькой травы - 200 гВспомогательное вещество:Этанол (спирт этиловый) 70% - достаточное количество для получения 1000 мл.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Анорексия, гипо- и анацидный гастрит, хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей по гипомоторному типу.

Способ применения и дозы

Внутрь по 15-20 капель, разведенных в 1/4 стакана воды, 2-3 раза в день за 20-30 минут до еды.Курс лечения 20-25 дней.Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам лекарственного препарата, повышенная желудочная секреция, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, острый холецистит, детский возраст до 12 лет.Если у вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.При длительном применении - изжога, гастралгия, диарея, тошнота, рвота.Если у вас наблюдаются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Возможны симптомы: тремор, головная боль, головокружение, судороги.Лечение - симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

В максимальной суточной дозе содержится 0,66 г абсолютного спирта, в максимальной разовой дозе - 0,22 г абсолютного спирта.Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами:Следует воздержаться от управления автотранспортом и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте