**Инструкция по применению**
**Помогуша сироп для детей слабительный 100 мл**

**Характеристики**

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Юг
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1




**Описание**

Слабительный сироп Помогуша для детей, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Плоды фенхеля регулируют моторную деятельность и уменьшают спазмы кишечника, снижают газообразование. Лактулоза стимулирует рост и жизнедеятельность собственной микрофлоры кишечника (бифидо- и лактобактерий). Плоды аниса повышают секреторную и двигательную функции желудка и кишечника. Плоды тмина усиливают секрецию пищеварительных желез, снижают процессы гниения и брожения в кишечнике. Листья земляники нормализуют обмен веществ и улучшают пищеварение. Плоды вишни и яблок оказывают легкое послабляющее действие, используются при функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта. Витамин С повышает сопротивляемость организма к инфекциям, защищает от внешних воздействий (охлаждение и перегревание). При недостатке витамина С отмечается потеря аппетита, нарушение секреторной и двигательной функции желудочно-кишечного тракта. Витамины группы В имеют особое значение для процессов роста и развития, характеризующихся высокой скоростью биосинтеза белка и нуклеиновых кислот. Участвуют в процессах кроветворения. При дефиците витаминов группы В отмечаются вялость, апатия, утомляемость, раздражительность, плаксивость, бессонница, снижение аппетита, запоры, бледность и сухость кожи. Снижается сопротивляемость организма к инфекциям.

**Форма выпуска**

Сироп

**Показания**

Рекомендуется в качестве диетического профилактического продукта для детей от 3-х лет, дополнительного источника витаминов С, В1, РР, В6 ВС, В12, лактулозы, оказывающего мягкое слабительное действие.

**Способ применения и дозы**

Детям от 3 до 7 лет – 3 чайных ложки (15 мл) в день.Детям от 7 до 14 лет – 4 чайных ложки (20 мл) в день. Можно применять с теплым чаем или минеральной водой. Продолжительность приёма 14 дней. Рекомендуется повторять приём после перерыва 7 дней.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции.

**Особые указания**

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. Перед применением проконсультироваться с врачом.

**Условия хранения**

При комнатной температуре