Инструкция по применению
Порциола капсулы 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Оболенское ФП
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 60.0



Состав

Карбомер полиакриловой кислоты* 500 мг * чистота вещества > 99.995%
Вспомогательные вещества: связующее вещество пищевой L-лейцин 5%, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

— снижение массы тела; — поддержка стабильной массы тела; — профилактика набора избыточной массы тела; — уменьшение потребления пищи при наличии избыточной массы тела и при ожирении.

Способ применения и дозы

Вероятность успешного применения капсул Порциола для снижения массы тела существенно повышается у пациентов, мотивированных на похудение. Капсулы Порциола необходимо проглатывать целиком, не раскрывая и не разжевывая, запивая 350 мл чистой питьевой неминеральной воды комнатной температуры, из расчета 180 мл на 1 капсулу или 350 мл на 2 капсулы для формирования гидрогеля. Капсулы принимают за 20 минут до начала приема пищи (обычно ужин). Если врач не назначил иначе, следует придерживаться следующей схемы применения: ИМТ* 25-30 кг/м2 • Цель приема капсул Порциола - снижение массы тела до ИМТ< 24.99 кг/м2 Женщины Мужчины 2 капсулы 1 раз в сутки до основного приема пищи (обычно ужин). Обязательно принимать капсулы вместе с 350 мл чистой питьевой неминеральной воды комнатной температуры. Минимальный вводный курс для достижения эффекта - 3 мес. Для последующей поддержки ИМТ рекомендуется постоянный прием капсул Порциола. ИМТ* 31-50 кг/м2 • Цель приема капсул Порциола - снижение массы тела до ИМТ< 25-30 кг/м2 Женщины Мужчины 2 капсулы 2 раза в сутки до приема пищи (обед и ужин). Обязательно принимать капсулы вместе с 350 мл чистой питьевой неминеральной воды комнатной температуры. Минимальный вводный курс для достижения эффекта - 5 мес. Для последующей поддержки ИМТ рекомендуется постоянный прием капсул Порциола. ИМТ* до 24.99 кг/м2 • Цель приема капсул Порциола - поддержка стабильной массы тела. Женщины Мужчины 1 капсула 1 раз в сутки до основного приема пищи (обычно обед или ужин). Обязательно принимать капсулу вместе с 180 мл чистой питьевой неминеральной воды комнатной температуры. Рекомендуемый режим приема капсул Порциола - постоянно. * - Индекс массы тела.

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав; — возраст менее 18 лет (исследования не проводились); — обострение язвенной болезни желудка и значительный гастроэзофагеальный рефлюкс. Перед применением следует проконсультироваться со специалиттом в следующих случаях: — при ожирении III-IV степени; — при наличии значительно выраженного гастроэзофагеального рефлюкса; — после операций на ЖКТ; — при наличии сахарного диабета или тяжелых соматических заболеваний.

Применение при беременности и кормлении грудью

Клинические исследования по оценке эффективности и безопасности у беременных женщин и в период лактации не проводились. Перед применением при беременности и в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Прием лекарственных препаратов или пищевых добавок необходимо проводить за 30 минут до или не ранее, чем через 30 минут после приема капсул Порциола. С целью восполнения необходимого баланса витаминов и микроэлементов на фоне уменьшения объема потребляемой пищи рекомендуется включить в ежедневный рацион специализированные витаминно-минеральные комплексы, применяемые при снижении веса. Порциола не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами и на выполнение работы, требующей повышенного внимания и быстроты двигательных реакций.

Условия хранения

В сухом месте