Инструкция по применению
Порталак Сироп 250 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Хорватия
Производитель: Белупо
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактулоза
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Действующее вещество

Лактулоза

Состав

1 мл сиропа содержит: действующее вещество: лактулоза 667 мг, вспомогательное вещество: вода – q.s.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

отсутствует

Показания

- запор: регуляция физиологического ритма опорожнения толстой кишки - размягчение стула в медицинских целях (геморрой, состояния до и/или после операции на толстой кишке и/или анальном отверстии) - печеночная энцефалопатия у взрослых: лечение и профилактика печеночной комы и прекомы

Способ применения и дозы

Для приема внутрь. ПОРТАЛАК® можно принимать как в разведенном, так и в неразведенном виде. Необходимо сразу проглотить принятую однократную дозу, не задерживая во рту. Доза препарата должна подбираться индивидуально. В случае назначения однократной суточной дозы, ее необходимо принимать в одно и то же время, например, во время завтрака. Во время терапии слабительными средствами рекомендуется принимать достаточное количество жидкости (1,5-2 литра, что равно 6-8 стаканам) в день. При лечении запора и для размягчения стула в медицинских целях Суточную дозу препарата можно принимать однократно (например, утром во время еды) или разделив ее на два приема, используя мерный стаканчик. Через несколько дней начальная доза может быть скорректирована до поддерживающей дозы в зависимости от реакции на прием препарата. Слабительный эффект может проявиться через 2-3 дня после начала приема препарата. Возраст Начальная суточная доза Поддерживающая суточная доза Взрослые и подростки 15-45 мл 15-30 мл Дети от 7 до 14 лет 15 мл 10-15 мл Дети от 1 года до 6 лет 5-10 мл 5-10 мл Дети до 1 года до 5 мл до 5 мл При лечении печеночной энцефалопатии (взрослые) Начальная доза: 3-4 раза в день по 30-45 мл сиропа. Затем переходят на поддерживающую дозу, подобранную индивидуально, чтобы мягкий стул был 2-3 раза в день. Безопасность и эффективность применения препарата у детей (до 18 лет) при печеночной энцефалопатии не установлена в связи с отсутствием данных. Пациенты пожилого возраста и пациенты с почечной или печеночной недостаточностью Нет специальных рекомендаций по дозированию, так как системное воздействие лактулозы незначительно.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к лактулозе или другим компонентам препарата, галактоземия, кишечная непроходимость, перфорация или риск перфорации желудочно-кишечного тракта, непереносимость галактозы или фруктозы, дефицит лактазы или глюкозогалактозная мальабсорбция, ректальные кровотечения (причиной которых не является геморрой, коло- или илеостома), острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, подозрение на аппендицит.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не предполагается никакого влияния на плод или грудного ребенка, так как системное воздействие лактулозы на беременную или кормящую женщину незначительно. Порталак® можно назначать во время беременности и в период грудного вскармливания. Не предполагается никакого влияния на репродуктивную функцию, так как системное воздействие лактулозы незначительно.

Побочные действия

В первые дни приема лактулозы возможно появление метеоризма. Как правило, он исчезает через несколько дней. В случае применения повышенных доз в течение длительного времени при лечении печеночной энцефалопатии у пациентов могут развиться нарушения водно-электролитного баланса вследствие диареи. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто (≥1/10) – диарея, часто (≥1/100, Другие нарушения: нечасто (≥1/1000, При применении у детей ожидается схожий профиль безопасности по сравнению с таковым у взрослых.

Передозировка

Симптомы: при приеме очень высокой дозы возможно появление боли в области живота, диареи, тошноты, рвоты, гипокалиемии, гипернатриемии. Лечение: прекращение приема препарата или уменьшение дозы. В случае большой потери жидкости вследствие диареи или рвоты может потребоваться коррекция нарушений водно-электролитного баланса.

Взаимодействие с другими препаратами

Из-за механизма действия лактулозы (заключающегося в снижении pH в толстой кишке) лекарственные средства, которые имеют зависимое высвобождение от pH толстой кишки (такие как препараты 5-аминосалициловой кислоты) могут быть инактивированы. При одновременном применении с диуретиками, глюкокортикостероидами, амфотерицином В возможно увеличение потери калия. Антациды и антибиотики, активные в отношении лактобактерий и бифидобактерий (в т.ч. неомицин, клиндамицин, рифаксимин) снижают эффективность лактулозы.

Особые указания

В случае возникновения абдоминальной боли неизвестного происхождения перед началом лечения или отсутствия терапевтического эффекта через несколько дней после начала приема препарата необходимо проконсультироваться с врачом. При приеме доз, рекомендуемых для лечения запора, содержание сахара не должно представлять проблемы для пациентов с сахарным диабетом. При лечении печеночной энцефалопатии обычно назначают более высокие дозы препарата, и содержание в нем сахара должно учитываться в отношении пациентов с сахарным диабетом. Длительный прием доз, превышающих рекомендуемые в инструкции по применению, или неправильное применение может привести к диарее и нарушению водно-электролитного баланса. При лечении детей слабительные средства должны применяться в исключительных случаях и под наблюдением врача. Необходимо учитывать, что во время лечения могут возникнуть расстройства рефлекса опорожнения. Препарат Порталак® может содержать незначительные количества сахаров (лактозу, галактозу, фруктозу), поэтому его не рекомендуется принимать пациентам, имеющим редкие наследственные заболевания, связанные с непереносимостью галактозы или фруктозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией. Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами Порталак® не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

Не допускать замерзания