Инструкция по применению
Постеризан мазь от геморроя 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Германия
Производитель: Др.Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Инактивированные микробные клетки E. coli
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Описание

Геморрой и анальные трещины относятся к числу распространенных проктологических заболеваний*. Причина развития анальной трещины – травма слизистой оболочки анального канала, чаще из-за прохождения твердых каловых масс, частого жидкого стула и других нарушений дефекации. Анальные трещины также могут быть связаны с острым и хроническим геморроем*. Средство от геморроя и анальных трещин должно влиять на несколько механизмов развития и прогрессирования заболевания. Мазь от геморроя и трещин Постеризан® оказывает комплексное действие**: # стимулирует восстановление поврежденных тканей # нормализует проницаемость и тонус кровеносных сосудов. # повышает местную устойчивость тканей к воздействию болезнетворных бактерий Мазь от геморроя Постеризан® назначают при анальном зуде, выделениях и жжении в анальной области***, анальных трещинах, экземе**.   Мазь Постеризан® имеет большой опыт клинического применения и доказательную базу в качестве средства лечения геморроя и анальных трещин*,**.   ***вследствие геморроидальных заболеваний. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ   Ссылки * Анальная трещина. Клинические рекомендации, 2021 г. **Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® мазь для ректального и наружного применения. Рег. уд. №: П N012331/01.

Действующее вещество

Инактивированные микробные клетки E. coli

Состав

В 1 г мази содержится: действующее вещество: стандартизированная суспензия бактерий E.coli 166,70 мг, (3,3 х 108±25% (2,475 х108- 4,125 х 108) микр. кл. E. coli, инактивированных и законсервированных в 3,3 мг сжиженного фенола); вспомогательные вещества: фенол сжиженный 3,30 мг (в составе СКВ) (соответствует содержанию фенола твердого 3,0 мг), ланолин 166,60 мг, вазелин 666,70 мг.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Постеризан мазь назначают взрослым при следующих заболеваниях: • анальный зуд, выделения и жжение в анальной области вследствие геморроидальных заболеваний; • анальные трещины;

Способ применения и дозы

Мазь наносится тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой оболочки утром и вечером, а также после каждой дефекации. Для более глубокого введения мази в прямую кишку можно использовать навинчивающийся аппликатор, прилагаемый к упаковке. Возможно комбинированное использование Постеризан® мази и Постеризан® суппозиториев ректальных. Курс лечения составляет 2-3 недели.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные по применению препарата беременными и кормящими женщинами отсутствуют. В качестве меры предосторожности перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Постеризан® не обладает побочными явлениями даже при длительном применении. В качестве консерванта в препарате используется фенол, поэтому возможны аллергические реакции у пациентов с повышенной чувствительностью к этому компоненту, при развитии которых применение препарата следует прекратить.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось. При случайном проглатывании (у детей) могут возникнуть желудочно-кишечные симптомы (боль в животе,тошнота).

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлены.

Особые указания

Содержит ланолин: может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит). При одновременном применении мази и латексных презервативов прочность последних может нарушаться, что снижает их надежность.

Условия хранения

В сухом месте