**Инструкция по применению**
**Постеризан Суппозитории от геморроя 10 шт**

## Характеристики




Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Германия
Производитель: Др.Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Инактивированные микробные клетки E. coli
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 36

## Описание

Геморрой – одно из самых распространенных заболеваний: им страдает каждый седьмой взрослый в мире*. Терапия должна быть направлена не только на облегчение симптомов, но и на предотвращение осложнений и восстановление поврежденных тканей*,**. Для медикаментозного лечения геморроя применяют свечи, мази, гели, кремы*. Постеризан® – универсальное средство от геморроя, которое работает вместе с иммунитетом. Препарат оказывает комплексное действие***: # стимулирует систему клеточного иммунитета # нормализует проницаемость и тонус кровеносных сосудов # стимулирует заживление ран и восстановление тканей. Постеризан® также способствует образованию пленки на слизистой оболочке кишечника, выступающей в роли местного защитного барьера3. Постеризан® суппозитории ректальные (свечи) показаны для лечения воспалений в анальной области и геморрое. Свечи Постеризан® подходят пациентам старше 18 лет, в том числе беременным и кормящим женщинам*, а также тем, кто принимает любые другие лекарственные препараты3.   *после консультации с врачом*** ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ   Ссылки *.       Геморрой. Клинические рекомендации. Москва, 2020. – 51 с. **.      Загрядский Е. А. Современная тактика лечения острого геморроя //Стационарозамещающие технологии: Амбулаторная хирургия, 2019. № 1-2. С. 112-117. ***. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан суппозитории. Рег. уд. №: П N012331/02.  

**Действующее вещество**

Инактивированные микробные клетки E. coli

**Состав**

В 1 суппозитории содержится: действующее вещество: стандартизированная суспензия культуры бактерий (СКВ) E. coli 387,10 мг (6,6 х 108 (4,95 х 108 - 8,25 х 108) микр. кл. E. coli, инактивированных и законсервированных в 6,6 мг сжиженного фенола); вспомогательные вещества: фенол сжиженный 6,60 мг (в составе СКВ) (соответствует содержанию фенола твердого 6,0 мг), жир твердый 1603,22 мг, макрогол глицеролгидроксистеарат 9,68 мг.

**Форма выпуска**

Суппозитории

**Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

**Показания**

Постеризан суппозитории ректальные назначают взрослым (с 18 лет) при следующих заболеваниях: • анальный зуд; • выделения и жжение в анальной области вследствие геморроидальных заболеваний.

**Способ применения и дозы**

Вводят в анальный проход по одному суппозиторию утром и вечером по возможности после дефекации. Рекомендуемая суточная доза - 2 суппозитория. Возможно комбинированное использование Постеризан® суппозиториев ректальных и Постеризан® мази для ректального и наружного применения. Курс лечения составляет 2-3 недели.

**Противопоказания**

• Гиперчувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата; • Детский возраст до 18 лет.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Данные по применению препарата беременными и кормящими женщинами отсутствуют. В качестве меры предосторожности перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

**Побочные действия**

Постеризан® не обладает побочными явлениями даже при длительном применении. В качестве консерванта в препарате используется фенол, поэтому возможны аллергические реакции у пациентов с повышенной чувствительностью к этому компоненту, при развитии которых применение препарата следует прекратить.

**Передозировка**

О случаях передозировки не сообщалось. При случайном проглатывании (у детей) могут возникнуть желудочно-кишечные симптомы (боль в животе, тошнота).

**Взаимодействие с другими препаратами**

Не выявлены.

**Особые указания**

Содержит макрогола глицерилгидроксистеарат. Может вызывать кожные реакции.

**Условия хранения**

В сухом месте