Инструкция по применению
Постиплания таблетки 0,75 мг 2 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармасинтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Левоноргестрел
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.75 мг

Описание

Таблетки круглой формы плоскоцилиндрические с фаской белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Левоноргестрел

Состав

Препарат Постиплания содержитДействующим веществом является левоноргесгрел. Каждая таблетка содержит 0,75 мг левоноргесгрела.Прочими ингридиентами являются: крахмал кукурузный,крахмал прежелатинизированный,кремния диоксид коллоидный, мальтитол,натрия стеарилфумарат,повидон К30,тальк,целлюлоза микрокристаллическая 102.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание. При приеме внутрь левоноргестрел быстро и практически полностью всасывается. Абсолютная биодоступность составляет около 100% от принятой дозы. После приема левоноргестрела в дозе 0,75 мг максимальная концентрация в плазме крови (Cmax), равная 14,1 нг/мл, достигается через 1,6 часа.Распределение. Левоноргестрел связывается с альбумином плазмы крови и с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ). Лишь 1,5% поступившей в организм дозы находится в свободной форме, а 65% связано с ГСПГ. Проникает в грудное молоко. Метаболизм. Метаболизм левоноргестрела соответствует метаболизму половых гормонов. Метаболизируется в печени путем гидроксилирования, метаболиты выводятся в форме конъюгированных глюкуронидов. Фармакологически активные метаболиты левоноргестрела неизвестны.Выведение. Левоноргестрел выводится примерно в равной степени почками и через кишечник, исключительно в форме метаболитов. Период полувыведения (T1/2) составляет около 26 ч.

Показания

Экстренная (посткоитальная) контрацепция в течение 72 часов (после незащищенного полового контакта или ненадежности используемого метода контрацепции).

Способ применения и дозы

Внутрь.Препарат Постиплания может применяться в любой период менструального цикла. В случае нерегулярного менструального цикла предварительно необходимо исключить беременность.Для достижения более надежного контрацептивного эффекта 2 таблетки препарата необходимо принять как можно скорее после незащищенного полового акта (но не позднее. 72 часов) после незащищенного полового акта, при этом вторую таблетку следует принять через 12 часов (но не позднее, чем через 16 часов) после приема первой таблетки.Если в течение 3-х часов после приема первой или второй таблетки произошла рвота, то следует принять ещё одну таблетку препарата Постиплания 0,75 мг.После приема экстренного контрацептивного средства до наступления следующей менструации следует применять негормональные методы контрацепции (презерватив, влагалищная диафрагма или шеечный колпачок).Применение препарата при повторном незащищенном половом акте в течение одного менструального цикла не рекомендуется из-за увеличения риска ациклических кровянистых выделений /кровотечений.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к левоноргестрелу и/или любому из вспомогательных веществ в составе препарата, Возраст до 16 лет, Печеночная недостаточность тяжелой степени, Беременность (в т.ч. предполагаемая), Период грудного вскармливания течении 24 часов после приема препарата, Непереносимость фруктозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, синдром глюкозо-галактозной недостаточности (в состав препарата входит мальтитол), Наличие в анамнезе воспалительных заболеваний органов малого таза или внематочной беременности.

Применение при беременности и кормлении грудью

БеременностьПрием препарата Постиплания во время беременности противопоказан. На основании имеющихся данных, неблагоприятного влияния левоноргестрела на плод в случае беременности на фоне применения экстренного метода контрацепции не выявлено.Период грудного вскармливанияЛевоноргестрел проникает в грудное молоко. После приема препарата грудное вскармливание следует прекратить на 24 часа.

Побочные действия

Возможные нежелательные реакции при применении левоноргестрела распределены по системно-органным классам с указанием частоты их развития согласно рекомендациям ВОЗ: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и Нарушения со стороны иммунной системыОчень редко: крапивница, кожная сыпь, кожный зуд, отек лица. Нарушение со стороны нервной системыОчень часто: головокружение.Часто: головная боль.Нарушения со стороны желудочно-кишечного трактаОчень часто – тошнота, боль в эпигастральной областиЧасто – рвота, диарея.Нарушения со стороны половых органов и молочной железыОчень часто – ациклические кровянистые выделения /кровотечения, боль внизу живота,Часто – болезненность молочных желез, задержка менструации (но не более 5-7 дней),Очень редко – дисменорея.Общие расстройства и нарушения в месте введенияОчень часто – чувство усталости.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, кровянистые выделения/кровотечение.Лечение: симптоматическое. Специфического антидота нет.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с индукторами микросомальных ферментов печени происходит ускорение метаболизма левоноргестрела.Следующие препараты могут снизить эффективность левоноргестрела: ампренавир, лансопразол, невирапин, окскарбазепин, такролимус, топирамат, третиноин, барбитураты (включая примидон), фенитоин и карбамазепин, препараты, содержащие зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), а также рифампицин, ритонавир, ампициллин, тетрациклин, рифабутин, гризеофульвин.Левоноргестрел снижает эффективность гипогликемических и антикоагулянтных (производные кумарина, фениндион) лекарственных средств. Повышает плазменные концентрации глюкокортикостероидов. Женщинам, принимающим эти препараты, следует обратиться к врачу за консультацией.Препараты, содержащие левоноргестрел, могут повышать риск токсичности циклоспорина вследствие подавления его метаболизма. Левоноргестрел может снижать эффективность улипристала путем конкурентного воздействия на рецептор прогестерона, в связи с чем, их одновременное применение не рекомендуется.

Особые указания

Левоноргестрел в дозе 0,75 мг следует применять исключительно для экстренной контрацепции!Повторное применение препарата в течение одного менструального цикла не рекомендуется!Препарат следует принять как можно скорее, но не позднее 72 часов после незащищенного полового акта. Эффективность экстренной контрацепции при отсроченном применении препарата существенно снижается. Препарат Постиплания не заменяет применение постоянных методов контрацепции.В большинстве случаев прием препарата в рекомендованных дозах не оказывает влияния на характер менструального цикла. Однако возможно появление ациклических кровянистых выделений и задержка менструации на несколько дней. При задержке менструации более чем на 5-7 дней и изменении ее характера (скудные или обильные выделения) необходимо исключить беременность. Появление болей внизу живота, обморочных состояний может свидетельствовать о внематочной (эктопической) беременности.Применение препарата у девочек-подростков до 16 лет возможно только в исключительных случаях (в том числе, при изнасиловании) и только после консультации врача-гинеколога. После проведения экстренной контрацепции рекомендована повторная консультация гинеколога.Экстренная контрацепция не защищает от заболеваний, передающихся половым путем!При заболеваниях желудочно-кишечного тракта (например, при болезни Крона), а также у женщин с избыточной массой тела, эффективность контрацептивного действия препарата может снижаться.Применение левоноргестрела у женщин с заболеваниями печени или желчевыводящих путей требует соблюдение мер предосторожности.Так, как левоноргестрел подавляет овуляцию, абсолютный риск внематочной беременности при его применении низкий. У женщин с высоким риском развития внематочной беременности (наличием воспалительных заболеваний органов малого таза [сальпигинита] или внематочной беременности в анамнезе применение левоноргестрела не рекомендуется. Сообщалось о случаях тромбоэмболических осложнений после приема левоноргестрела в дозе 1,5 мг. В связи с чем, у женщин с существующими факторами риска (наследственной или приобретенной предрасположенностью к тромбозам, наличием тромбоэмболических осложнений в семейном анамнезе) следует учитывать возможность таких осложнений.Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмамиВлияние применения левоноргестрела на способность управлять транспортными средствами и механизмами не исследовалось. В случае развития головокружения следует воздержаться от управления транспортными средствами, механизмами и другой деятельности, требующей повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.