Инструкция по применению
Прегабалин-Рихтер Капсулы 150 мг 14 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Прегабалин
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 150 мг
Срок годности: 36

Описание

Капсулы 75 мг Твердые желатиновые капсулы, размера № 4 Coni-Snap, со светло-коричневой крышечкой и корпусом, содержащие белый или почти белый кристаллический порошок. Капсулы 150 мг Твердые желатиновые капсулы, размера № 2 Coni-Snap, с коричневой крышечкой и корпусом, содержащие белый или почти белый кристаллический порошок. Капсулы 300 мг Твердые желатиновые капсулы, размера № 0 Coni-Snap, с темно-коричневой крышечкой и корпусом, содержащие белый или почти белый кристаллический порошок.

Действующее вещество

Прегабалин

Состав

1 капсула содержит: _**Дозировка 150 мг**_ _Действующее вещество:_ прегабалин 150,0 мг. _Вспомогательные вещества:_ лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, тальк. _Состав желатиновой капсулы:_ _Крышечка_: желатин, титана диоксид, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид черный. _Корпус_: желатин, титана диоксид, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид черный.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

\- Нейропатическая боль Лечение нейропатической боли у взрослых пациентов. _\- Эпилепсия_ В качестве дополнительной терапии у взрослых пациентов с парциальными судорожными припадками, сопровождающимися или не сопровождающимися вторичной генерализацией. _\- Генерализованное тревожное расстройство_ Лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых пациентов. _\- Фибромиалгия_ Лечение фибромиалгии у взрослых пациентов.

Противопоказания

\- Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата; \- редкие наследственные заболевания, в том числе непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или глюкозо-галактозная мальабсорбция; \- детский и подростковый возраст до 17 лет включительно (нет данных по применению).

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Данных о применении прегабалина у беременных женщин недостаточно. В доклинических исследованиях были зарегистрированы признаки репродуктивной токсичности препарата. Поэтому прегабалин можно применять при беременности только в том случае, если предполагаемая польза для матери явно превышает возможный риск для плода. При применении препарата женщины репродуктивного возраста должны использовать адекватные методы контрацепции. _Грудное вскармливание_ Прегабалин проникает в грудное молоко. Так как безопасность применения прегабалина у новорожденных неизвестна, во время лечения прегабалином не рекомендуется кормить грудью. Следует прекратить грудное вскармливание или отменить терапию прегабалином, принимая во внимание необходимость терапии для матери и грудного вскармливания для новорожденного. Клинических данных о влиянии прегабалина на фертильность женщин с сохраненной детородной функцией нет.

Передозировка

Симптомы При передозировке препарата (до 15 г) других (не описанных выше) нежелательных реакций зарегистрировано не было. В ходе пострегистрационного применения наиболее частыми нежелательными явлениями, развивавшимися при передозировке прегабалина, являлись: аффективные расстройства, сонливость, спутанность сознания, депрессия, ажитация и беспокойство, в редких случаях были зарегистрированы случаи комы. Также отмечались судороги. _Лечение_ Промывание желудка, поддерживающая терапия и при необходимости - гемодиализ (см. раздел "Способ применения и дозы", Табл. 1).

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.