Инструкция по применению
Прегнакеа капсулы 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Великобритания
Производитель: Vitabiotics
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30



Описание

Коричневые твердые желатиновые капсулы размера "0", с логотипами белого цвета "Vitabiotics" со знаком "Ω" на крышке капсулы и "Pregnacare"® на корпусе капсулы. Содержимое капсул - смесь мелко-гранулированного порошка желто-коричневого цвета и гранул разного размера от белого до светло-коричневого цвета, со специфическим запахом. Допускается наличие гранул других оттенков.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Каждая капсула содержит:Активные компоненты:Бетакаротин (как смесь натуральных каротиноидов) - 4,2 мгВитамин D3 (как Колекальциферол 100 МЕ) - 2,5 мкгВитамин Е (как D-альфа-токоферола сукцинат 21 мг) - 20 мгВитамин В1 (как Тиамина мононитрат 3,6 мг) - 3 мгВитамин В2 (как Рибофлавин) - 2 мгВитамин В6 (как Пиридоксина гидрохлорид) - 10 мгВитамин В12 (как Цианокобаламин) - 6 мкгВитамин К1 (как Фитоменадион) - 200 мкгФолиевая кислота - 400 мкгНиацин (Никотинамид/Витамин В3) - 20 мгВитамин С (как Аскорбиновая кислота 73 мг) - 70 мгЖелезо (как Железа фумарат 63,3 мг) - 20 мгЦинк (как Цинка сульфат Н20 41 мг) - 15 мгМагний (как Магния оксид 248 мг) - 150 мгЙод (как Калия йодид 183 мкг) - 140 мкгМедь (как Меди сульфат Н20 2,8 мг) - 1 мгСостав оболочки капсул: желатин (81,0166 мг), вода очищенная (13,72 мг), титана диоксид (0,49 мг), красный оксид железа (1,7346 мг), черный оксид железа (1,0388 мг).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Предупреждение и коррекция состояний витаминно-минеральной недостаточности у женщин, планирующих беременность, в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

По одной капсуле в день во время или сразу после приема пищи, запивая водой. Не разжевывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка

Случаи передозировки не известны.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется принимать одновременно другие поливитаминные комплексы во избежании передозировки.

Особые указания

Не превышать рекомендованную дозировку.Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что совершенно безвредно и обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата.Возможно окрашивание стула в темный цвет, что обусловлено наличием в составе препарата железа.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортным средством и выполнению работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С.Хранить в недоступном для детей месте.