Инструкция по применению
Прелакс сироп 400 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Фелицата Холдинг
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактулоза
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная, вязкая жидкость, от светло-желтого до коричневато-желтого цвета.

Действующее вещество

Лактулоза

Состав

100 мл препарата содержит: действующее вещество: лактулоза - 66,7 г
вспомогательное вещество: вода очищенная до 100 мл

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Абсорбция - низкая (выведение почками - 3%). Не всасываясь, доходит до толстого отдела кишечника, где расщепляется кишечной флорой. Полностью метаболизируется при дозах 40-75 мл, при более высоких дозировках частично выводится через кишечник в неизмененном виде.

Показания

Запор: регуляция физиологического ритма опорожнения толстой кишки, размягчение стула в медицинских целях (геморрой, послеоперационный период хирургических вмешательств на толстой кишке или в области анального отверстия), печёночная энцефалопатия у взрослых: лечение и профилактика печеночной комы и прекомы.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для приема внутрь, во время или после еды. Лактулоза может быть назначена в виде однократной дневной дозы или эта доза может быть поделена на два приема с использованием мерного стаканчика. Все дозировки должны подбираться индивидуально. В случае назначения приема одной дозы в день, ее необходимо принимать в одно и то же время, например, во время завтрака. При запорах: дети до 1 года: 5 мл/сут, дети от 1 до 6 лет: 5-10 мл/сут, дети от 7 до 14 лет: 15 мл/сут, дети старше 14 лет и взрослые: в первые три дня по 15-45 мл/сут, затем 10-30 мл/сут. Слабительный эффект препарата развивается в течение первых двух дней приема. Продолжительность лечения от 4 недель до 3-4 месяцев. При печеночной коме, прекоме, энцефалопатии: Начальная доза составляет 30-45 мл 3 раза в сутки. Затем дозу подбирают так, чтобы мягкий стул был 2-3 раза в сутки. Лечение может продолжаться до 3-х месяцев и больше. При печеночной коме, прекоме и печеночной энцефалопатии: внутрь по 30-50 мл 3 раза в сутки, суточная доза может составлять 90-190 мл, затем в индивидуально подобранной поддерживающей дозе (обеспечивающей pH кала 5-5,5) 2-3 раза в сутки. В послеоперационном периоде: Взрослым - по 10-30 мл 3 раза в сутки, детям старше 1 года по 5-10 мл 2-3 раза в сутки, до 1 года - по 5 мл 2-3 раза в сутки. Препарат назначают через 18-24 ч после операции в течение 3-5 дней. В случае прекоматозного состояния или состояния комы препарат может быть назначен в виде клизмы 300 мл препарата / 700 мл воды. Клизму следует удерживать в течение 30-60 минут. Процедуру следует повторять каждые 4-6 часов до тех пор, пока не станет возможным назначение препарата перорально.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, галактоземия, непереносимость галактозы и/или фруктозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, кишечная непроходимость, ректальные кровотечения, коло-, илеостома, - подозрение на аппендицит.

Применение при беременности и кормлении грудью

В случае необходимости лактулозу можно назначать во время беременности и лактации.

Побочные действия

Побочные явления носят, как правило, слабовыраженный и обратимый характер, и являются следствием превышения дозы. В первые дни приема лактулозы возможно появление метеоризма, который, как правило, исчезает через 1-2 дня. В случае применения повышенных доз в течение длительного времени при лечении печеночной энцефалопатии у пациента в результате диареи могут развиться нарушения электролитного баланса и, как следствие, судороги, метеоризм, тошнота, головная боль, головокружение, аритмия, миалгия, повышенная утомляемость, слабость.

Передозировка

При использовании очень высокой дозы возможны боль в животе и диарея. В этом случае необходимо уменьшить дозу или прекратить прием препарата. Большая потеря жидкости вследствие диареи или рвоты может потребовать коррекции нарушения водно-электролитного баланса.

Взаимодействие с другими препаратами

При использовании терапевтических доз лактулозы не отмечалось клинически достоверных взаимодействий с другими лекарственными препаратами, тем не менее, не рекомендуется принимать препарат в течение двух часов после приема другого лекарственного средства. Антибиотики и антациды снижают эффект лактулозы. Изменяет pH-зависимое высвобождение кишечнорастворимых лекарственных средств.

Особые указания

В случае отсутствия терапевтического эффекта в течение двух дней или при возобновлении запора после лечения пациенту рекомендуется проконсультироваться с врачом. Препарат должен назначаться с осторожностью пациентам с непереносимостью галактозы. Необходимо учитывать, что препарат может содержать незначительные количества связанных сахаров (например, лактоза, галактоза, эпилактоза). При лечении печеночной (пре)комы обычно назначают более высокие дозы препарата, что должно учитываться в отношении пациентов с сахарным диабетом. При лечении детей слабительные средства должны применяться в исключительных случаях и под наблюдением врача. Необходимо учитывать, что во время лечения могут возникнуть расстройства рефлекса опорожнения. Пациентам с редким врожденными нарушениями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или глюкозо-галактозная мальабсорбция, не должны использовать данный лекарственный препарат. При длительном применении препарата (более 6 месяцев) следует регулярно контролировать концентрацию калия, хлора и углекислого газа в плазме крови. При гастрокардиальном синдроме следует увеличивать дозы постепенно, чтобы избежать метеоризма. Безопасность и эффективность применения препарата у детей (до 18 лет) при печеночной энцефалопатии не установлена.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Лактулоза не оказывает влияния на скорость психомоторных реакций и на способность к вождению автомобиля или управлению машинами и механизмами, требующими повышенного внимания.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в не доступном для детей месте.