Инструкция по применению
Превалин спрей назальный 20мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Германия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бентонит
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Бентонит

Состав

Бентонит, ксантановая камедь, глицерина моностеарат, фосфат калия, дикалийфосфат, глицерин, кунжутное масло, вода, масло мяты.

Форма выпуска

Спрей

Показания

Начинайте использовать Превалин сразу при первых признаках аллергического ринита, желательно до того, как аллергическая реакция проявилась полностью. Для достижения наилучшего результата используйте Превалин профилактически — до контакта с аллергенами, чтобы не допустить их внедрение в слизистую носа и развитие симптомов аллергии, таких как чихание, насморк, заложенность носа, зуд глаз, слезотечение.Если аллергическая реакция уже проявилась полностью, Превалин можно использовать в комплексном лечении в сочетании с другими противоаллергическими средствами, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение аллергенов в организм и усугубление аллергической реакции.

Способ применения и дозы

Интраназально! По 1–2 впрыска в каждый носовой ход, 2–3 раза в день (одна доза обеспечивает защиту на 4–6 часов). Детям 6–12 лет следует применять Превалин Кидс и только под присмотром взрослых. Перед каждым применением необходимо прочистить нос.Начинайте использовать Превалин сразу при первых признаках аллергического ринита, желательно до того, как аллергическая реакция проявилась полностью. Для достижения наилучшего результата используйте Превалин профилактически — до контакта с аллергенами, чтобы не допустить их внедрение в слизистую носа и развитие симптомов аллергии, таких как чихание, насморк, заложенность носа, зуд глаз, слезотечение.Если аллергическая реакция уже проявилась полностью, Превалин можно использовать в комплексном лечении в сочетании с другими противоаллергическими средствами, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение аллергенов в организм и усугубление аллергической реакции.

Противопоказания

Не предназначен для использования у детей в возрасте до 12 лет. Не рекомендуется использовать Превалин Алерджи при повышенной чувствительности к компонентам Превалин Алерджи.

Побочные действия

В первый час после введения препарата вы можете ощутить незначительное чувство заложенности носа. Это временное явление, которое быстро проходит и окончательно исчезает при регулярном применении. Если вы испытываете выраженный дискомфорт после применения препарата, прекратите его использование и проконсультируйтесь с врачом.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие Превалин Алерджи с лекарственными средствами или другими видами лечения аллергии не установлено. Использование Превалин Алерджи не должно влиять на эффективность антигистаминных препаратов.

Условия хранения

Беречь от детей