Инструкция по применению
Примафунгин суппозитории вагинальные 100 мг 3 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Анжеро-Судженский ХФЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Натамицин
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 100 мг



Описание

Суппозитории цилиндрокопической формы, от светло-желтого с кремовым оттенком до желтого с кремовым оттенком цвета. На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Действующее вещество

Натамицин

Состав

Состав на 1 суппозиторий:действующее вещество: натамицин - 100 мг, вспомогательные вещества: цетиловый спирт - 690 мг, сорбитап триолеат - 460 мг, полисорбат 80 - 460 мг, натрия гидрокарбонат - 69 мг, адипиновая кислота - 64 мг, основа для суппозиториев: полусинтетические глицериды (Суппоцир АМ) - 707 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Примафунгин® не оказывает системного действия, так как практически не всасывается с поверхности слизистых оболочек.

Показания

Вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, вызванные главным образом грибами рода Candida.

Способ применения и дозы

При кандидозных вагинитах, вульвитах, вульвовагинитах: интравагинально по одному суппозиторию в течение 3-6 дней.Суппозитории, предварительно освободив от контурной упаковки, вводят во влагалище, находясь в положении лежа, как можно глубже 1 раз в сутки на ночь. Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней. Во время менструации применение суппозиториев прерывают.При упорном течении вагинитов, вызванных Candida albicans, дополнительно назначают натамицин в виде таблеток для приема внутрь: по 1 таблетке 4 раза в день в течение 10-20 дней для санации очага кандидозной инфекции в кишечнике.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата ПРИМАФУНГИН® в период беременности и лактации.

Побочные действия

При местном применении возможно легкое раздражение и ощущение жжения в месте введения.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Примафунгин® не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Примафунгин® с другими лекарственными препаратами не описано.

Особые указания

При вагинальной аппликации под действием температуры тела суппозитории превращаются в пенистую массу, что способствует равномерному распределению натамицина по слизистой оболочке влагалища.В период лечения нет необходимости в исключении половых контактов, однако рекомендуется провести обследование половых партнеров и, в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения натамицином. В период лечения следует использовать барьерные методы контрацепции.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата Примафунгин® не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.