Инструкция по применению
Пробифор Капсулы 5 ДОЗ 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ПроБиоФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии бифидум
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 12.0

Действующее вещество

Бифидобактерии бифидум

Состав

1 капс. содержит живые бифидобактерии, сорбированные на активированном угле не менее 500 млн КОЕ, лактоза до 0,20 г.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Диарея различной этиологии.Пищевые токсикоинфекции.Острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной природы (сальмонеллезы, шигеллезы, энтероколиты, вызванные патогенными представителями рода энтеробактерий или стафилококками, ротавирусная инфекция) или неустановленной этиологии.Дисбактериозы различной этиологии, в том числе развившиеся на фоне и после приема антибиотиков, цитостатической, лучевой терапии.Осложняющие течение вирусных гепатитов, цирроза печени, дивертикулеза кишечника различной локализации.Новорожденным (в т.ч. недоношенным) детям с отягощенным преморбидным фоном, начиная с периода пребывания в родильном доме, для улучшения течения периода адаптации, а также при выраженных дисбактериозах.Беременным женщинам при подготовке к родам, кесареву сечению и в послеоперационном периоде.

Способ применения и дозы

Пробифор принимают внутрь во время приема пищи, при необходимости - независимо от приема пищи. Препарат в форме капсул назначают взрослым и детям в возрасте 5 лет и старше. Капсулы принимают, запивая кипяченой водой или кисломолочным продуктом. Острая кишечная инфекция, пищевая токсикоинфекция, синдром диареи. Взрослым и детям старше 7 лет назначают по 2-3 капсулы 2 раза/сут. Курс лечения - 3-5 дней. Детям в возрасте от 5 до 7 лет назначают по 1 капсуле 3-4 раза/сут. (возможно с коротким интервалом в 2-3 часа). Курс лечения - 2-3 дня, при сохранении клинических симптомов курс лечения увеличивают до 4-5 дней. Взрослым для прекращения диареи в ранние сроки заболевания - по 3 капсулы 2 раза /сут. с интервалом от 30 мин до 1 ч. Дозу можно увеличить до 6 капсул в один прием 1 раз/сут. Курс лечения - от 1 до 3 дней. Хроническая патология ЖКТ и функциональные кишечные нарушения. Взрослым и детям старше 5 лет назначают по 3 капс. в один прием 1 раз/сут. во время вечернего приема пищи. Взрослым можно также назначать по 2 капсулы 2 раза/сут. Курс лечения составляет 5-15 дней. При тяжелом течении заболевания дозу для взрослых и детей старше 5 лет можно увеличить до 6 капсул в сут. Курс лечения увеличивают до 30 дней. Дисбактериоз различной этиологии, хронические кишечные инфекции, пациенты с иммунодефицитными состояниями, с кожными заболеваниями, а также для улучшения течения периода адаптации у новорожденных. Взрослым и детям старше 7 лет назначают по 2-3 капсулы 2 раза/сут. Детям в возрасте 5-7 лет - по 1 капс. 3 раза/сут. Курс лечения - 7-10 дней.

Противопоказания

Врожденная недостаточность лактазы. Нарушение всасывания глюкозы-галактозы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат разрешен для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах Побочное действие препарата не установлено.

Передозировка

Передозировка препарата Пробифор невозможна из-за отсутствия кумулятивного действия и избыточного накопления в кишечнике.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается. При приеме с антибиотиками возможно снижение терапевтической эффективности препарата.

Особые указания

С осторожностью следует применять препарат при лактазной недостаточности.