Инструкция по применению
Пробифор Капсулы 5 доз 18 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ПроБиоФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии бифидум
Количество в упаковке: 18
Срок годности: 12.0

Действующее вещество

Бифидобактерии бифидум

Состав

Активное вещество: бифидобактерии, сорбированные на активированном угле,
Вспомогательное вещество: лактозы моногидрат - до 0,2 г.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Диарея различной этиологии.Пищевые токсикоинфекции.Острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной природы (сальмонеллезы, шигеллезы, энтероколиты, вызванные патогенными представителями рода энтеробактерий или стафилококками, ротавирусная инфекция) или неустановленной этиологии.Дисбактериозы различной этиологии, в том числе развившиеся на фоне и после приема антибиотиков, цитостатической, лучевой терапии.Осложняющие течение вирусных гепатитов, цирроза печени, дивертикулеза кишечника различной локализации.Новорожденным (в т.ч. недоношенным) детям с отягощенным преморбидным фоном, начиная с периода пребывания в родильном доме, для улучшения течения периода адаптации, а также при выраженных дисбактериозах.Беременным женщинам при подготовке к родам, кесареву сечению и в послеоперационном периоде.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время приема пищи, при необходимости независимо от приема пищи. Порошок перед употреблением смешивают с жидкой пищей, желательно кисломолочным продуктом, новорожденным и детям грудного возраста - с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания. Можно смешать препарат с 30–50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения. Капсулы запивают водой. Для детей и пациентов, которые не могут проглотить целую капсулу, ее вскрывают, содержимое капсулы принимают так же, как порошок. Острая кишечная инфекция, пищевая токсикоинфекция, диарея: дети до 6 месяцев - по 1 пакетику 2 раза в день; старше 6 месяцев - по 1 пакетику 3–4 раза в день (возможно с интервалом в 2–3 ч), курс лечения 2–3 дня, при сохранении симптомов курс лечения удлиняется до 4–5 дней; от 5 до 7 лет - по 1 капсуле 3–4 раза в день (возможно с интервалом в 2–3 ч), курс лечения 2–3 дня, при сохранении симптомов курс лечения удлиняется до 4–5 дней; старше 7 лет и взрослые - по 2–3 пакетика/капсулы 2 раза в день, курс лечения 3–5 дней. Прекращение диареи в ранние сроки заболевания: взрослые - по 3 пакетика /капсулы 2 раза в день с интервалом 30–60 мин. Дозировку можно увеличить до 6 пакетиков/капсул 1 раз в день, курс лечения - 1–3 дня. Хроническая патология ЖКТ, синдром раздраженного кишечника: дети с 5 лет - однократно 3 капсулы во время вечернего приема пищи; дети и взрослые - однократно 3 пакетика во время вечернего приема пищи; взрослые - возможно 3 капсулы однократно или по 2 пакетика/капсулы 2 раза в день. Курс лечения 5–15 дней. При тяжелом течении заболевания: дети с 1 года до 5 лет - до 6 пакетиков в день; дети с 5 лет и взрослые - до 6 пакетиков/капсул в день, курс - до 30 дней. Комплексное лечение ОРВИ и гриппа: дети до 5 лет с 1–2-го дня заболевания - по 1 пакетику 3 раза в день; дети старше 5 лет и взрослые с 1–2-го дня заболевания - по 1 пакетику/капсуле 3 раза в день, курс лечения - 2 дня. Хирургические больные, беременные женщины при подготовке к кесареву сечению с целью снижения послеоперационных осложнений: до операции дети до 5 лет - по 1 пакетику 3 раза в день в течение 2–3 дней; старше 5 лет и взрослые - 1 пакетик/капсула 3 раза в день в течение 2–3 дней; лицам, страдающим дисбактериозом кишечника, получавшим антибиотики и химиопрепараты, предоперационный курс удлиняется до 7 дней; со 2–7-го дня после операции дети до 5 лет - по 1 пакетику, дети старше 5 лет и взрослые - 1 пакетик /капсула 3 раза в день в течение 2–3 дней, по показаниям - до 7–10 дней. Дисбактериозы различной этиологии, хронические кишечные инфекции, больные с иммунодефицитными состояниями, кожными заболеваниями, а также улучшение течения периода адаптации у новорожденных детей (в т.ч. недоношенные):

недоношенные новорожденные - по 1 пакетику 1–2 раза в день; доношенные новорожденные и дети до 3 лет - по 1 пакетику 2 раза в день; дети с 3 до 5 лет - по 1 пакетику 3 раза в день; с 5 до 7 лет - по 1 пакетику/капсуле 3 раза в день; старше 7 лет и взрослые - по 2–3 пакетика/капсулы 2 раза в день. Курс лечения - 7–10 дней.

Противопоказания

Врожденная недостаточность лактазы. Нарушение всасывания глюкозы-галактозы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат разрешен для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах препарата не установлено.

Передозировка

Передозировка препарата Пробифор невозможна из-за отсутствия кумулятивного действия и избыточного накопления в кишечнике.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается. При приеме с антибиотиками возможно снижение терапевтической эффективности препарата.

Особые указания

С осторожностью следует применять препарат при лактазной недостаточности.