Инструкция по применению
Пробифор Порошок для приема внутрь 500 млн.КОЕ/пакет 6 шт

Характеристики

Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: ПроБиоФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии бифидум
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 500 млн КОЕ



Действующее вещество

Бифидобактерии бифидум

Состав

1 пак. содержит живые бифидобактерии, сорбированные на активированном угле не менее 500 млн КОЕ, лактоза до 0,85 г,

Форма выпуска

Порошок

Показания

Патогенными представителями рода энтеробактерий или стафилококками. ротавирусная инфекция) или неустановленной этиологии, пищевые токсикоинфекции. Синдром диареи различной этиологии.Хронические неспецифические воспалительные заболевания пищеварительного тракта, сопровождающиеся нарушением микрофлоры и угнетением репаративных процессов слизистой оболочки кишечника (гастродуоденит, панкреатит, проктосигмоидит, колит, в т.ч. язвенный колит).Дисбактериоз различной этиологии, в т.ч. развившийся на фоне и после приема антибиотиков, цитостатической, лучевой терапии. осложняющий течение вирусных гепатитов, цирроза печени, дивертикулеза кишечника различной локализации. Синдром раздраженного кишечника, другие функциональные кишечные нарушения. синдром нарушенного кишечного всасывания различной этиологии.Новорожденным (в т.ч. недоношенным) детям с отягощенным преморбидным фоном, начиная с периода пребывания в родильном доме, для улучшения течения периода адаптации, а также при выраженных дисбактериозах.В комплексном лечении больных (в т.ч. новорожденных) с вторичными иммунодефицитными состояниями, при тяжелых инфекционно-воспалительных и гнойно-септических заболеваниях (сепсис, перитонит и др.). с кожными заболеваниями (атопический дерматит, стрептодермия, экзема).В комплексном лечении ОРВИ и гриппа.В комплексном лечении хирургических больных (в т.ч. травматологического профиля) для предоперационной подготовки и профилактики послеоперационных осложнений. при постгастрорезекционных расстройствах и состоянии после холецистэктомии.В комплексном лечении онкологических больных при проведении химиотерапии, лучевой терапии, до и после хирургических вмешательств.Беременным женщинам при подготовке к родам, кесареву сечению (для снижения послеоперационных осложнений).

Способ применения и дозы

При острой кишечной инфекции, пищевой токсикоинфекции, диарее: детям до 6 месяцев по 1 пакету 2 раза в день; детям старше 6 месяцев по 1 пакету 3-4 раза в день (возможно с коротким интервалом в 2-3 часа), курсом 2-3 дня; при сохранении клинических симптомов курс лечения удлиняется до 4-5 дней; Детям старше 7 лет и взрослым по 2-3 пакета 2 раза в день курсом 3-5 дней; взрослым для прекращения диареи в ранние сроки заболевания по 3 пакета 2 раза в день с интервалом 30 минут – 1 час; количество принимаемого препарата можно увеличить до 6 пакетов одномоментно на прием 1 раз в сутки, курс от 1 до 3 дней. При хронической патологии желудочно-кишечного тракта и функциональных кишечных нарушениях – детям и взрослым однократно 3 пакета во время вечернего приема пищи, взрослым – возможно по 2 пакета 2 раза в день. Курс лечения 5-15 дней. При тяжелом течении заболевания количество принимаемого препарата можно увеличить детям с 1 года и взрослым до 6 пакетов в сутки, а курс увеличить до 30 дней. При дисбактериозах различной этиологии, хронических кишечных инфекциях, у больных с иммунодефицитными состояниями, с кожными заболеваниями, а также для улучшения течения периода адаптации у новорожденных детей: недоношенным новорожденным по 1 пакету 1-2 раза в день; доношенным новорожденным и детям до 3 лет по 1 пакету 2 раза в день; детям с 3 до 7 лет – по 1 пакету 3 раза в день; детям старше 7 лет и взрослым по 2-3 пакета – 2 раза в день. Курс лечения 7-10 дней. В комплексном лечении острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа применяют пациентам всех возрастных групп с 1-2 дня заболевания по 1 пакету 3 раза в сутки. Курс лечения 2 дня. Хирургическим больным, беременным женщинам при подготовке к кесареву сечению с целью снижения послеоперационных осложнений: до операции по 1 пакету 3 раза в день в течение 2-3 дней; лицам, страдающим дисбактериозом кишечника, получавшим антибиотики и химиопрепараты, предоперационный курс удлиняется до 7 дней; со 2-7 дня после операции по 1 пакету 3 раза в день в течение 2-3 дней, по показаниям – 7-10 дней. Пробифор принимают во время приема пищи, при необходимости независимо от приема пищи. Препарат перед употреблением смешивают с жидкой пищей, желательно кисломолочным продуктом, новорожденным и детям грудного возраста – с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания. Можно смешать препарат с 30-50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

Противопоказания

Врожденная недостаточность лактазы. Нарушение всасывания глюкозы-галактозы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат разрешен для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Не установлены.

Передозировка

Передозировка препарата Пробифор невозможна из-за отсутствия кумулятивного действия и избыточного накопления в кишечнике.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается. При приеме с антибиотиками возможно снижение терапевтической эффективности препарата.

Особые указания

С осторожностью следует применять препарат при лактазной недостаточности.