Инструкция по применению
Пробифор капсулы 5 доз 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ПроБиоФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии бифидум
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 500 млн КОЕ

Описание

Капсула № 3 твердая желатиновая, цилиндрической формы с полусферическими концами. Корпус капсулы белый непрозрачный, крышечка - желтая непрозрачная. Содержимое капсулы - порошок со слабым кисломолочным запахом от светло-серого до темно-серого цвета с черными частичками угля.

Действующее вещество

Бифидобактерии бифидум

Состав

Одна капсула содержит:активное вещество: бифидобактерии B.bifidum, сорбированные на активированном угле - не менее 500 млн колониеобразующих единиц,вспомогательное вещество: лактозы моногидрат - до 0,20 г.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Диарея различной этиологии, пищевые токсикоинфекции, острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной природы (сальмонеллезы шигеллезы энтероколиты вызванные патогенными представителями рода энтеробактерий или стафилококками ротавирусная инфекция) или неустановленной этиологии, дисбактериозы различной этиологии в том числе развившиеся на фоне и после приема антибиотиков цитостатической лучевой терапии, осложняющие течение вирусных гепатитов цирроза печени дивертикулеза кишечника различной локализации, новорожденным (в т.ч. недоношенным) детям с отягощенным преморбидным фоном начиная с периода пребывания в родильном доме для улучшения течения периода адаптации а также при выраженных дисбактериозах, беременным женщинам при подготовке к родам кесареву сечению и в послеоперационном периоде.Препарат применяется в составе комплексной терапии хронических инфекционных и неспецифических воспалительных заболеваний пищеварительного тракта (гастродуоденит панкреатит проктосигмоидит колит в том числе язвенный колит), больных с вторичными иммунодефицитными состояниями при тяжелых инфекционно-воспалительных и гнойносептических заболеваниях (сепсис перитонит и др.), с кожными заболеваниями (атопический дерматит стрептодермия экзема), синдрома раздраженного кишечника, острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, хирургических больных (в т.ч. травматологического профиля) для предоперационной подготовки и профилактики послеоперационных осложнений, при постгастрорезекционных расстройствах и состояниях после холецистэктомий, онкологических больных при проведении химиотерапии лучевой терапии до и после хирургических вмешательств.

Способ применения и дозы

Препарат применяют детям с периода новорожденности и взрослым.При острой кишечной инфекции пищевой токсикоинфекции диарее: детям до 6 месяцев: по 1 капсуле 2 раза в день, детям старше 6 месяцев по 1 капсуле 3-4 раза в день (возможно с коротким интервалом в 2-3 часа) курсом 2-3 дня, при сохранении клинических симптомов курс лечения удлиняется до 4-5 дней, детям старше 7 лет и взрослым: по 2-3 капсулы 2 раза в день курс лечения 3-5 дней взрослым для прекращения диареи в ранние сроки заболевания по 3 капсулы 2 раза в день с интервалом 30 минут - 1 час дозировку можно увеличить до 6 капсул одномоментно на прием 1 раз в день курс лечения 1 - 3 дня.При хронической патологии желудочно-кишечного тракта синдроме раздраженного кишечника - детям по 3 капсулы однократно во время вечернего приема пищи взрослым по 3 капсулы однократно или по 2 капсулы 2 раза в день. Курс лечения 5-15 дней. При тяжелом течении заболевания количество принимаемого препарата можно увеличить взрослым и детям до 6 капсул в день а курс лечения увеличить до 30 дней.При дисбактериозах различной этиологии хронических кишечных инфекциях у больных с иммунодефицитными состояниями с кожными заболеваниями а также для улучшения течения периода адаптации у новорожденных детей: недоношенным новорожденным: по 1 капсуле 1-2 раза в день, доношенным новорожденным и детям до 3 лет: по 1 капсуле 2 раза в день, детям с 3 до 7 лет: по 1 капсуле 3 раза в день, детям старше 7 лет и взрослым: по 2-3 капсулы 2 раза в день.Курс лечения 7-10 дней.В комплексном лечении острых респираторных вирусных инфекций и гриппа - пациентам всех возрастных групп с 1-2 дня заболевания по 1 капсуле 3 раза в день. Курс лечения 2 дня.Хирургическим больным беременным женщинам при подготовке к кесареву сечению с целью снижения послеоперационных осложнений: до операции: по 1 капсуле 3 раза в день в течение 2-3 дней, лицам страдающим дисбактериозом кишечника получавшим антибиотики и химиопрепараты предоперационный курс удлиняется до 7 дней со 2-7 дня после операции: по 1 капсуле 3 раза в день в течение 2-3 дней по показаниям - 7-10 дней.Пробифор® принимают внутрь во время приема пищи при необходимости независимо от приема пищи запивая водой.Детям и пациентам которые не могут проглотить целую капсулу ее вскрывают. Содержимое капсулы смешивают с жидкой пищей желательно кисломолочным продуктом новорожденным и детям грудного возраста - с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания.Можно смешать содержимое капсулы с 10-50 мл кипяченой воды комнатной температуры при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить не добиваясь полного растворения.

Противопоказания

Врожденная недостаточность лактазы нарушение всасывания глюкозы-галактозы повышенная чувствительность к компонентам препарата

Применение при беременности и кормлении грудью

Пробифор® разрешен для применения женщинам в периоды беременности и грудного вскармливания. Особых условий приема нет.

Побочные действия

Не установлены.

Передозировка

Случаев передозировки не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается.При одновременном применении с антибиотиками возможно снижение эффекта препарата Пробифор® - при приеме антибиотиков рекомендованный интервал между приемом антибиотика и препарата Пробифор® составляет 3-4 часа.

Особые указания

Мер предосторожности нет.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Пробифор® не влияет на способность управлять транспортными средствами механизмами.

Условия хранения

Хранить при температуре от 2 до 10 °С.Хранить в недоступном для детей месте.