# Инструкция по применению
# Прогестерон Ампулы 1 % 1 мл 10 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: Дальхимфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Прогестерон
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 25 мг/мл




## Описание

Прогестаген

## Действующее вещество

Прогестерон

## Состав

Прогестерон

## Форма выпуска

Ампулы

## Фармакокинетика

После в/м инъекции всасывается быстро и практически полностью. Метаболизируется в печени, большинство метаболитов образуют конъюгаты с глюкуроновой и серной кислотами. Т1/2 из плазмы составляет несколько минут. Выводится с мочой – 50-60% и с калом – более 10%. Количество метаболитов, которые выводятся с мочой колеблется в зависимости от фазы желтого тела.

**Показания**

Дисфункциональные маточные кровотечения, метроррагия, аменорея, привычный выкидыш. Контрацепция.

**Способ применения и дозы**

Режим дозирования индивидуальный. Доза, частота и продолжительность лечения определяются по схеме в зависимости от показаний и клинической ситуации.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

В случаях крайней необходимости возможно применение прогестерона при беременности при установленной недостаточности гормонов желтого тела. Прогестерон не применяют у женщин, планирующих беременность в ближайшее время.

**Побочные действия**

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД. Со стороны обмена веществ: отеки.Со стороны пищеварительной системы: нарушения функции печени, желтуха, редко (при длительном применении) - тошнота, рвота.Со стороны эндокринной системы: редко (при длительном применении) - снижение либидо, увеличение массы тела, боль и напряжение в молочных железах, нерегулярные маточные кровотечения.Со стороны ЦНС: редко (при длительном применении) - головная боль, депрессия.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Уменьшает интенсивность действия препаратов, стимулирующих гладкие мышцы матки, анаболических стероидов, гонадотропных гормонов передней доли гипофиза. Уменьшает лактогенный эффект окситоцина. Усиливает действие диуретиков, антигипертензивных препаратов, иммунодепрессантов. При одновременном применении с барбитуратами отмечается уменьшение действия прогестерона.

**Особые указания**

С осторожностью применяют у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями функции печени или почек, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, мигренью, депрессией.

**Условия хранения**

Беречь от детей. При комнатной температуре.