Инструкция по применению
Прогликем Капсулы 25мг 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: МЕРК
Порядок отпуска: по рецепту
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 25 мг
Срок годности: 36.0

Описание

Гиперинсулизм – заболевание, обусловленное нарушением выработки инсулина. Когда его вырабатывается чрезмерно много, организму начинает не хватать глюкозы, мозг не получает достаточного количества питательных веществ. Из-за кислородного голодания, которое испытывает мозг, нарушается функционирование нервной системы, человек становится вялым, временами случаются приступы судорог. Прогликем (действующее вещество – Диазоксид) – один из препаратов, которые используются для консервативного лечения подобных состояний. Он притормаживает слишком активную выработку инсулина. На фоне приема этого препарата объем иммунореактивного инсулина снижается достаточно быстро.Применение. Обычно суточная доза препарата составляет 100-600 мг (в зависимости от веса больного) и делится на несколько приемов. Препарат принимают под контролем лечащего врача, который следит за состоянием пациента и может скорректировать дозу при появлении побочных действий. Однако, по отзывам, обычно он хорошо переносится и может приниматься годами в качестве поддерживающей терапии. Единственное, что нужно учитывать: Прогликем (Диазоксид) имеет свойство задерживать жидкость в организме, поэтому совместно с его приемом часто прописывают еще и мочегонные средства.

Состав

Активное вещество: Диазоксид 25 мг.Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, стеарат магния, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Гиперурикемия на фоне подагры и подагрического артрита, гипогликемия, обусловленная гиперинсулинизмом, опухолевые заболевания эндокринной части поджелудочной железы, экстрапанкреатические опухоли, идиопатическая семейная гипогликемия, гиперплазия островков Лангерганса, незидиобластоз, предоперационная подготовка и послеоперационная терапия в качестве профилактического гипогликемического средства.

Способ применения и дозы

Принимать после еды.Можно начать лечение с дневной дозы 5 мг/кг веса тела, если врач не порекомендовал вам ничего другого. Эту дозу можно, однако, увеличить, чтобы устранить недостаточное содержание сахара в крови. Дневная доза должны вводится 2 – 3 порциями с перерывами по 8 или 12 часов.Детям, страдающим гипогликемией, сверхчувствительной к лейцину, в некоторых случаях требуется прием 15 – 20 мг диазоксида на кг веса тела. Эту дневную дозу также следует применять 2 – 3 порциями с перерывом в 8 — 12 часов.Для более точной дозировки для детей особенно пригодны капсулы по 25 мг.Пациентам с почечной недостаточностью необходимо дозу снизить.

Противопоказания

Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, При сердечной недостаточности, При идиопатической постпрандиальной гипогликемии, При кормлении грудью, При непереносимости к Диазоксиду или другим компонентам препарата.

Побочные действия

Головная боль, головокружение, покраснение кожных покровов, задержка натрия и воды в организме, гипергликемия (повышенное содержание сахара в крови), выраженная артериальная гипотония (пониженное артериальное давление) вплоть до коллапса (резкого падения артериального давления), появление признаков ишемии сердца или мозга, спутанность сознания, аллергические реакции.

Условия хранения

Хранить в сухом и недоступном для детей месте, вдали от прямых солнечных лучей.