Инструкция по применению
Прокто-Гливенол Крем ректальный 2 % 30 г

Характеристики



Форма выпуска: Крем
Страна: Ирландия
Производитель: Рекордати Химическая и Фарм. индустрия
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Трибенозид+Лидокаин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Трибенозид+Лидокаин

Состав

Действующее вещество: Трибенозид + Лидокаин (Tribenosidum + Lidocainum)
Концентрация действующего вещества (мг): Трибенозид 5 г,лидокаина гидрохлорид 2.12 г

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

ВсасываниеПри местном применении абсорбируется от 2 до 20% трибенозида, содержащегося в креме.МетаболизмВ организме трибенозид в значительной степени метаболизируется в печени.

Показания

Геморрой (внутренний и наружный).

Способ применения и дозы

Ректально. При выраженных клинических симптомах крем следует применять утром и вечером. При регрессии острых симптомов частоту применения уменьшают до 1 раза в сутки. При внутренних геморроидальных узлах крем вводят с помощью насадки. 30 г крема (1 тюбик) достаточно примерно для 20-30 применений.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, печеночная недостаточность, беременность (I триместр).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение в I триместре беременности противопоказано. При применении препарата во II и III триместрах беременности необходимо учитывать возможный риск для плода.При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания следует взвесить ожидаемую пользу терапии для матери и потенциальный риск для ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции, жжение, усиление перистальтики кишечника.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы.Лечение: при случайном приеме внутрь рекомендуется промывание ЖКТ, а также симптоматическая поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия не зарегистрированы.

Особые указания

Если симптомы заболевания не ослабевают в процессе лечения или отмечается появление новых необычных ощущений, следует обратиться к врачу.При применении крема Прокто-Гливенол необходимо следить за гигиеной анальной области, избегать чрезмерного напряжения, принимать меры для поддержания мягкой консистенции стула.Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмамиПрепарат не оказывает влияния на концентрацию внимания и быстроту психических и двигательных реакций при использовании в рекомендуемых дозах.

Условия хранения

В сухом месте