Инструкция по применению
Проктоседил Мазь 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Индия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензокаин+Бутамбен+Гидрокортизон+Фрамицетин+Эскулозид
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24



Действующее вещество

Бензокаин+Бутамбен+Гидрокортизон+Фрамицетин+Эскулозид

Состав

1 г содержит:гидрокортизона ацетат 5.58 мгфрамицетина сульфат 10 мггепарин натрия 100 МЕэскулозид 10 мгбензокаин (этиламинобензоат) 10 мгбутамбен (бутиламинобензоат) 10 мгВспомогательные вещества: холестерол, парафин жидкий, парафин мягкий белый, полисорбат 80, пропиленгликоль, макрогол (полиэтиленгликоль) 400, макрогол (полиэтиленгликоль) 4000, макрогол (полиэтиленгликоль) 1540.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

— внутренний и наружный геморрой (острый и хронический);— профилактика рецидивов внутреннего и наружного геморроя;— перианальная экзема;— проктит;— острые и хронические трещины заднего прохода;— предоперационное и послеоперационное лечение больных с геморроем;— послеродовый геморрой.

Способ применения и дозы

Наружно. Небольшое количество мази следует наносить пальцем на участки локализации зуда или боли утром и вечером, а также после каждой дефекации.Для более глубокого введения в прямую кишку следует надеть аппликатор на тюбик с мазью, ввести его в прямую кишку, убедиться в том, что он введен достаточно глубоко в прямую кишку, и затем, осторожно нажимая на тюбик с нижнего конца, вводить мазь в прямую кишку, постепенно вынимая аппликатор.Мазь можно применять отдельно или в сочетании с ректальными капсулами Проктоседил М.Проктоседил применяется в течение короткого времени (не более 7 дней).

Противопоказания

— туберкулезное, вирусное, грибковое поражение аноректальной зоны;— беременность;— период лактации (грудного вскармливания);— детский возраст (в связи с отсутствием клинических данных по применению препарата).— повышенная чувствительность к компонентам препарата;С осторожностью следует применять препарат у пациентов с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Местные реакции: чувство дискомфорта в области прямой кишки, жжение в прямой кишке, сухость слизистой оболочки прямой кишки.Прочие: присоединение вторичной инфекции, аллергические реакции и другие реакции повышенной чувствительности. При применении препарата в высоких дозах и в течение длительного времени существует риск возникновения системных побочных эффектов, связанных с наличием в составе препарата гидрокортизона.

Передозировка

Данные о передозировке не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Проктоседил не предоставлены.

Особые указания

Не следует применять препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

В сухом месте