
Инструкция по применению
Проктозан мазь для ректального и наружного применения 20 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Германия
Производитель: Штада
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Буфексамаг
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60.0

Описание

Однородная мазь желтого цвета.

Действующее вещество

Буфексамаг

Состав

1 г мази содержит: Активные ингредиенты: буфексамак — 50 мг, висмута субгаллат — 50 мг, титана диоксид — 50 мг, лидокаина гидрохлорид в виде лидокаина гидрохлорида моногидрата — 5 мг, Вспомогательные ингредиенты: ланолин, парафин жидкий легкий, поликос (воск полиэтилена 20 %, парафин жидкий 80 %), изопропилпальмитат, сорбитана сесквиолеат, сорбитол (70 % раствор, некристаллизирующийся), вода очищенная.

Форма выпуска

Мазь

Показания

геморрой 1-й и 2-й степени, трещины заднего прохода, острая и хроническая анальная экзема, воспалительные процессы в области прямой кишки (проктит).

Способ применения и дозы

Наружное применение Полоску мази длиной 1-2 см тонким слоем наносят на пораженный участок зоны заднего прохода 2 раза в сутки. Перед применением кожу следует вымыть теплой водой (без мыла) и вытереть мягкой салфеткой. Ректальное применение Мазь Проктозан® при помощи прилагаемого аппликатора вводится в прямую кишку 1-2 раза в сутки по возможности после опорожнения кишечника. Рекомендуется продолжение применения препарата после стихания острых явлений в течение 8 — 10 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, специфические воспалительные процессы (сифилис, туберкулез), детский возраст, беременность, лактация.

Побочные действия

Возможны реакции гиперчувствительности к компонентам препарата (жжение, зуд, покраснение кожи перианальной зоны, отек, образование пузырьков, чешуек и др.), перианальный контактный дерматит.

Особые указания

При отсутствии эффекта, а также при появлении неприятных ощущений и других побочных явлений следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. При одновременном применении препарата Проктозан® и презервативов может отмечаться снижение прочности презервативов, что снижает их надежность.

Условия хранения

В сухом месте