Инструкция по применению
Проктозан Суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Германия
Производитель: Штада
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Буфексамак+висмута субгаллат+титана диоксид+лидокаина гидрохлорида моногидрат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 250 мг+100 мг+10 мг+100 мг
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Буфексамак+висмута субгаллат+титана диоксид+лидокаина гидрохлорида моногидрат

Состав

1 свеча содержит: буфексамак - 250 мг, субгаллат висмута - 100 мг, титана диоксид - 100 мг, лидокаина гидрохлорид гидрат - 10 мг Вспомогательное вещество: жир твердый - 1540 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Геморрой 1-й и 2-й степени, трещины заднего прохода, острая и хроническая анальная экзема, воспалительные процессы в области прямой кишки (проктит).

Способ применения и дозы

Применяют ректально по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки, по возможности после опорожнения кишечника. Рекомендуется продолжение применения препарата после стихания острых явлений в течение 8 – 10 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, специфические воспалительные процессы (сифилис, туберкулез), детский возраст, беременность, лактация.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Проктозан противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможны реакции гиперчувствительности к компонентам препарата (жжение, зуд, покраснение кожи перианальной зоны, отек, образование пузырьков, чешуек и др.).

Передозировка

Данные о передозировке препарата Проктозан не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Проктозан не предоставлены.

Особые указания

При отсутствии эффекта, а также при появлении неприятных ощущений и других побочных явлений следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Не рекомендуется длительное применение препарата. При необходимости длительного лечения следует использовать лекарственные средства, не содержащие местные анестетики. При одновременном применении препарата Проктозан® и презерватива может отмечаться снижение прочности презервативов, что снижает их надежность.

Условия хранения

Беречь от детей