Инструкция по применению
Пролаксанит таблетки 20 мг 20 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Крушины ольховидной кора
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 20 мг

Описание

Таблетки круглые двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, белого цвета.

Действующее вещество

Крушины ольховидной кора

Состав

Состав на одну таблетку Активный компонент Крушины экстракт сухой с содержанием суммы антраценпроизводных в пересчете на франгулаэмодин и сухое вещество 2,0 - 0,20 г Вспомогательные вещества ядра Крахмал картофельный - 0,00625 г Кальция стеарат - 0,00125 г Тальк - 0,00125 г Сахар (сахароза) - 0,00100 г Натрия гидрокарбонат - 0,00025 г Вспомогательные вещества оболочки Сахар (сахароза) - 0,09431 г Магния карбонат основной (магния гидроксикарбонат) - 0,01908 г Тальк – 0,00161 г Аэросил (кремния диоксид коллоидный) - 0,00160 г Поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский (повидон) - 0,00160 г Титана диоксид - 0,00160 г Вазелиновое масло (парафин жидкий) - 0,00010 г Воск пчелиный - 0,00010 г

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Хронический запор.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1-2 таблетки перед сном. Курс лечения 1-2 недели. Внутрь, по 1-2 таблетки перед сном. Курс лечения 1-2 недели. Если через 2 недели лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяете препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые воспалительные заболевания кишечника (энтерит, колит), метроррагия, запор неврогенного и эндокринного происхождения, спастический запор, кишечная непроходимость, синдром острого живота, аппендицит, острые лихорадочные состояния, беременность, период грудного вскармливания, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет. С осторожностью Сахарный диабет. Лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом. Применение при беременности и в период грудного вскармливания Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), ощущение дискомфорта в животе (метеоризм, спастические боли, тошнота). Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Возможны коликообразные боли в животе, тенезмы, тошнота, рвота, диарея. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано. Если Вы применяете другие лекарственные препараты (в том числе без рецептурные) перед применением препарата Пролаксанит® проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Не рекомендуется длительный прием препарата без консультации врача. При длительном применении препарата может развиться привыкание, в связи с чем его прием целесообразно чередовать с другими слабительными средствами. Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,102 г углеводов (0,0085 ХЕ). Возможно окрашивание мочи в желтый цвет (из-за наличия хризофановой кислоты), что не опасно для организма и не требует отмены препарата. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.