Инструкция по применению
Пронтосан Гель для ран 250 мл

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Швейцария
Производитель: Браун Медикал
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Пронтосан - готовый к применению стерильный водорастворимый гель.Готовый к применению стерильный гель, содержащий полигексанид и ундециленамидопропил бетаин, для наружного применения. Имеет широкий антимикробный спектр действия. Активен в отношении Pseudomonas aeruginosa, E. coli, St. aureus, St. epidermidis, MRSA, грибов.Используется для очищения, увлажнения и деконтаминации ран различного происхождения. Эффективно разрушает и удаляет биологические пленки. Поглощает раневой запах. Может находиться на ране от одного до нескольких дней. ПреимуществаНаиболее эффективен для лечения ран с замедленным процессом краевой эпителизацией. Обладает отличной тканевой переносимостью, не повреждает грануляции. Совместим с большинством известных раневых повязок. Не вызывает аллергических реакций. Прозрачный, без цвета и запаха. Вскрытые флакон или тубу можно использовать в течение 2-х месяцев.

Состав

0,1 % полиаминопропил бигуанид (полигексанид),0,1% сурфактант (поверхностно-активное вещество), гидроксиэтилцеллюлоза, глицерол, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Показания

Применяется для лечения длительно не заживающих трофических язв при артериальной и венозной недостаточности, пролежней, синдрома диабетической стопы, и т. д., ожогов 1-й и 2-й степени. Для обработки донорских участков, послеоперационных и посттравматических ран, наружных язв при онкологических заболеваниях, поражений кожи при экземе и нейродермите.

Способ применения и дозы

Прежде всего, поверхность раны необходимо промыть раствором Пронтосан для удаления некротических тканей, фибрина, бактериальных биопленок, остатков раневого отделяемого. Для более тщательного удаления некротических тканей, фибрина и бактериальных биопленок рекомендуется продолжить обработку раны гелем Пронтосан.Обработку рекомендуется проводить с учетом фазы раневого процесса. Поверхность раны должна покрываться слоем геля не менее 3 мм толщиной. Пронтосан наносится на рану или вводится в полость раны. Сверху слой геля покрывается двумя-тремя стерильными марлевыми салфетками или другими перевязочными средствами. Гель должен оставаться на ране до следующей перевязки. Сначала перевязки выполняются ежедневно. По мере очищения раны перевязки можно выполнять через один - два дня. Гель может оставаться на ране до нескольких дней.В зависимости от того, когда намечается очередная перевязка, может применяться различное количество геля, слоем толщиной от 3 до 5 мм.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Побочные действия

В очень редких случаях после нанесения геля Пронтосан в этом месте может возникать зуд, проходящий через несколько минут.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.