Инструкция по применению
Пронтосан Гель для ран 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Швейцария
Производитель: Браун Медикал
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Пронтосан - готовый к применению стерильный водорастворимый гель.Внешний вид и запах: прозрачный, бесцветный, со слабым запахом.Пронтосан применяется для очищения, увлажнения и деконтаминации раневых поверхностей.Заживление раны может замедляться из-за присутствия в ране экссудата, некротизированных тканей, фибрина и бактериальных биопленок, которые создают условия для роста патогенной микрофлоры и тормозят раневое заживление.Гель позволяет проводить тщательное очищение раневой поверхности, увлажнять рану и подавлять бактериальную флору, что создает условия для скорейшего раневого заживления. Благодаря антибактериальному компоненту может с успехом использоваться для предупреждения инфицирования ран патогенными микроорганизмами.Не обладает аллергизирующими и раздражающими свойствами, безболезненно наносится на раневую поверхность, не тормозит развитие грануляций и не мешает эпителизации раны.

Состав

0,1 % полиаминопропил бигуанид (полигексанид),0,1% сурфактант (поверхностно-активное вещество), гидроксиэтилцеллюлоза, глицерол, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Показания

Для очищения и ускорения заживления ран.

Способ применения и дозы

Прежде всего, поверхность раны необходимо промыть раствором Пронтосан для удаления некротических тканей, фибрина, бактериальных биопленок, остатков раневого отделяемого. Для более тщательного удаления некротических тканей, фибрина и бактериальных биопленок рекомендуется продолжить обработку раны гелем Пронтосан.Обработку рекомендуется проводить с учетом фазы раневого процесса. Поверхность раны должна покрываться слоем геля не менее 3 мм толщиной. Пронтосан наносится на рану или вводится в полость раны. Сверху слой геля покрывается двумя-тремя стерильными марлевыми салфетками или другими перевязочными средствами. Гель должен оставаться на ране до следующей перевязки. Сначала перевязки выполняются ежедневно. По мере очищения раны перевязки можно выполнять через один - два дня. Гель может оставаться на ране до нескольких дней.В зависимости от того, когда намечается очередная перевязка, может применяться различное количество геля, слоем толщиной от 3 до 5 мм.

Противопоказания

В очень редких случаях после нанесения геля Пронтосан в этом месте может возникать зуд, проходящий через несколько минут.

Побочные действия

Небольшое чувство жжения после нанесения геля (исчезает уже через нескольких минут).

Взаимодействие с другими препаратами

Гель Пронтосан не должен смешиваться и применяться вместе с другими дезинфицирующими средствами, мазями, маслами, поверхностно-активными веществами, ферментами и т.д

Особые указания

Только для наружного использования. Не для приема внутрь. Не применять для внутримышечного или внутривенного введения!Избегать попадания в глаза и на гиалиновые хрящи, при попадании тщательно промыть физиологическим раствором. Во избежание реинфицирования раны флаконы, непосредственно касавшиеся поверхности раны, необходимо выбрасывать сразу после использования.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25° С.Хранить в недоступном для детей месте.